Indice

Capitolo 1. INTRODUZIONE 2

SPAZI DI PROBABILITÀ E VARIABILI ALEATORIE 5

Capitolo 2. PROBABILITÀ UNIFORMI 6
- 2.1. Spazi di probabilità uniformi 6
- 2.2. Calcolo combinatorio 7
- 2.3. Proprietà delle probabilità uniformi 9
- 2.4. Indipendenza 11
- 2.5. Utilizzo della probabilità 15
- 2.6. Stime di Probabilità e statistica 16
- 2.7. Teorema di De Moivre-Laplace 19

Capitolo 3. PROBABILITÀ SU INSIEMI FINITI 24
- 3.1. Spazi di probabilità su insiemi finiti 24
- 3.2. Indipendenza 25
- 3.3. Probabilità condizionate 26
- 3.4. Formula di Bayes 28
- 3.5. Alcuni calcoli di probabilita' in genetica 30

Capitolo 4. VARIABILI ALEATORIE FINITE 33
- 4.1. Variabili aleatorie 33
- 4.2. Valore atteso 35
- 4.3. Indipendenza tra variabili aleatorie 40
- 4.4. Deviazioni dalla media 45
- 4.5. Diseguaglianze e legge debole dei grandi numeri 48
- 4.6. Approssimazione di Poisson 51

Capitolo 5. PROBABILITÀ SU INSIEMI DISCRETI 52
- 5.1. Spazi di probabilità su insiemi discreti 52
- 5.2. Variabili aleatorie discrete 54
- 5.3. Vettori aleatori e variabili aleatorie congiunte 58

Capitolo 6. PROBABILITÀ NEL CONTINUO 62
- 6.1. Variabili aleatorie continue 62
- 6.2. Funzione di distribuzione 65
- 6.3. Variabili esponenziali e Gamma 68
- 6.4. Distribuzione congiunta di due variabili aleatorie 69
- 6.5. Vettori aleatori continui 76

CAPITOLO 1

INTRODUZIONE

Il calcolo delle probabilità e la statistica costituiscono quella parte della matematica e della scienza più in generale che si occupa dei fenomeni casuali; questo fatto crea talvolta qualche difficoltà nel comprenderne scopi e metodi. Per tentare di ovviare a queste incomprensioni, noi iniziamo qui presentando alcuni problemi, tratti da situazioni concrete del mondo reale, che, opportunamente formalizzati e predisposti per un approccio scientifico utile alla loro trattazione, faranno da guida per lo sviluppo di quasi tutta la teoria che presenteremo. Il lettore è invitato a tentare di fornire qualche risposta, sia inizialmente che durante lo sviluppo della materia, nonché a riferirsi a questi problemi quando stia perdendo di vista il senso di quanto viene discusso. Tutto ciò renderà la teoria molto semplice e naturale.

Esempio 1. *Supponiamo di partecipare ad un gioco in cui viene lanciata, da un addetto, una moneta* 1000 *volte, e supponiamo che noi si vinca 1$ se esce testa e se ne perda 1 se esce croce. Vogliamo valutare la nostra reazione ai vari possibili valori di* k*, il numero di teste sui* 1000 *lanci. Quale reazione sarebbe ragionevole avere se* k *fosse* 510*? E* 492*? Oppure* 459*,* 423*,* 397*,* 354*,* 299*,* 212*,* 154*,* 22*?*

Esempio 2. *Su una scatola di componenti elettronici contenente 100 pezzi è indicato che ognuno ha tempo medio di funzionamento di 1000 ore. Come nell'esempio precedente, proviamo ad immaginare quale sarebbe una reazione ragionevole se il tempo totale di funzionamento dell'intera scatola fosse 99800, oppure 95400 oppure 90200 oppure 84000 oppure 72000 ore.*

Esempio 3. *Supponiamo che in una popolazione vi siano solo due possibili forme di un certo carattere, per semplificare diciamo capelli biondi o castani, determinati dalla trasmissione genetica che ci è ora nota, con biondo carattere recessivo. Se nella popolazione i biondi sono il* 30%*, su* 100 *figli di genitori entrambi castani, quanti ce ne aspettiamo di biondi?*

Problemi come questi si riferiscono ad esperimenti di cui non si riesce a determinare con certezza l'esito. Ci sono di solito varie o anche

molte possibili alternative e le informazioni in nostro possesso non ci permettono di prevedere quale di queste si verificherà.

Non ci interessa discutere qui se questo sia solo un problema di mancanza di informazioni (come ad esempio nei problemi che si riferiscono alla meccanica classica) o se l'indeterminatezza sia intimamente connessa con la natura dell'esperimento (come si assume, per esempio, in meccanica quantistica o in una interpretazione soggettiva della materia qui esposta). Ci interessa soltanto che tale indeterminatezza renda per noi l'esperimento ad esito incerto. Chiameremo tali esperimenti casuali.

Poiché però spesso a noi interessa tentare qualche previsione dell'esito dell'esperimento descriveremo qui un metodo che è stato sviluppato a partire dal XVII secolo (e presumibilmente già nel mondo greco) per suggerirci gli esiti più frequenti. L'idea principale è quella di introdurre una nuova quantità, a cui si dà comunemente il nome di probabilità, che appunto serva come misura di quanto spesso o quanto facilmente si realizza un certo esito di un esperimento casuale.

Naturalmente non importa che tale quantità esista realmente, così come non è molto importante sapere se la lunghezza di un tavolo esiste davvero, quest'ultima cosa essendo difficilmente accertabile anche per il fatto che alcuni atomi si attaccano e si staccano continuamente alle estremità e che queste non sono affatto liscie quando osservate al microscopio. Quello che importa però, sia per le lunghezze che per le probabilità, è che queste quantità siano misurabili con relativa facilità in vari casi interessanti e che si sia poi in grado, sulla base di tali misurazioni, di dire qualcosa di utile per qualche problema di un certo rilievo.

In considerazione di queste finalità pratiche non deve sorprendere che, essendovi vari diversi ambiti di applicazione, vi siano definizioni di probabilità non uguali tra loro e che vi siano discussioni anche accese sui meriti delle varie definizioni; queste però spesso finiscono per essere argomentazioni su quale sia quella più 'vera'. La discussione filosofica è poi ulteriormente complicata dall'ovvia presenza di avvenimenti con esito non determinato a cui non è semplice associare una valutazione di probabilità, e dalla meno ovvia esistenza di altri il cui risultato è ben determinato, ma di complessità tale che conviene inventarsi una probabilità.

Noi presenteremo qui alcune di queste definizioni e poi discuteremo lo sviluppo di una teoria elementare ed alcune applicazioni di rilievo.

La caratteristica principale della probabilità è che, al contrario della lunghezza che si misura attraverso la comparazione fisica con un oggetto campione, essa si misura attraverso la riflessione astratta, usando logica e calcolo matematico. Queste note espongono vari metodi di calcolo di probabilità e varie applicazioni dei risultati.

Essendo un prodotto di calcoli logici, la probabilità verrà misurata tramite numeri puri; spesso nel linguaggio comune essa viene riportata in frazione di 100, ossia in percentuale: così si parla di 30% o 2%. E' però più comodo matematicamente esprimere la probabilità in frazione di 1, indicando quindi $0,3 = 30\%$ oppure $0,02 = 2\%$, principalmente perché la moltiplicazione di probabilità riesce così più comoda: il 2% del 30% è lo $0,6\%$, direttamente ottenibile da $0,02 \cdot 0,3 = 0,006$.

Si noti che anche le frequenze sono espresse tramite percentuali (come fatto nell'esempio 3), ma che si tratta in parte di una coincidenza essendo entrambi numeri puri.

Avendo deciso di misurare le probabilità con valori in $[0, 1]$ si vede che per due casi estremi è possibile determinare subito il valore della probabilità. Agli eventi logicamente impossibili da realizzare è naturale assegnare probabilità 0, mentre a quelli certi va assegnata probabilità 1. A tutte le altre situazioni andrà assegnata una probabilità nell'intervallo $[0, 1]$ chiuso (ciò signfica che non escludiamo l'esistenza di situazioni logicamente possibili ma di probabilità 0). Nei prossimi capitoli cominceremo a vedere vari metodi per tale assegnazione.

Esercizio 1. *Calcolare il* 3% *del* 25%.

Esercizio 2. *Calcolare il* 90% *del* 20% *dell'*80%.

Esercizio 3. *Calcolare l'*80% *del* 120%.

Esercizio 4. *Calcolare, se possibile, la probabilità che una asserzione falsa venga correttamente ritenuta vera.*

Esercizio 5. *Calcolare, se possibile, la probabilità di un evento la cui probabilità sia uguale ad* 1 *meno la probabilità stessa.*

SPAZI DI PROBABILITÀ E VARIABILI ALEATORIE

CAPITOLO 2

PROBABILITÀ UNIFORMI

2.1. Spazi di probabilità uniformi

Iniziamo ora a definire questa nuova quantità, la probabilità, in modo che serva per alcune situazioni semplici, come ad esempio:

Esempio 4. *Nel lancio di una moneta calcolare la probabilità che venga testa.*

Esempio 5. *Nel lancio di un dado calcolare la probabilità che il dado mostri la faccia 3.*

In questi esempi dobbiamo naturalmente fare un piccolo sforzo di astrazione. Assumiamo che il risultato di un lancio sia necessariamente una faccia (non una moneta verticale o la sparizione del dado), e che prima del lancio vi sia stato un adeguato mescolamento. Cosa questo sia non è ben determinato, ma a noi interessa l'esito di tale mescolamento, e cioè che, per quanto ne sappiamo, ognuna delle facce si comporta in modo equivalente a tutte le altre. Ossia, se dobbiamo assegnare una probabilità ad una, dobbiamo assegnare la stessa probabilità alle altre. Avendo già deciso che la probabilità che qualcosa avvenga è 1 ne consegue che per queste situazioni è adeguata la prossima definizione. E' chiaro che il discorso esposto finora è euristico, ossia non rigoroso ma fatto cercando di interpretare la realtà esterna, mentre da ora in poi si inizia a fare matematica partendo da una definizione precisa e sviluppandone le conseguenze. Per decidere a quali situazioni si potrà applicare si ritorna a fare discorsi euristici: a tutte quelle situazioni in cui vi siano un numero finito di alternative equivalenti dal punto di vista probabilistico. In molti casi non si potrà utilizzare questa definizione e ne svilupperemo altre nel seguito.

Visto che si parla di un numero finito di alternative conviene considerare un insieme finito ed adottare quindi la terminologia delle teoria degli insiemi.

Definizione 1. *(Spazi di probabilità uniformi). Sia S un insieme finito. I suoi sottinsiemi $A \subseteq S$ sono detti eventi, e la probabilità uniforme su S è una funzione P definita su ogni evento A da*

$$P(A) = \frac{|A|}{|S|},$$

avendo indicato con $|A|$ il numero di elementi dell'insieme A.

Si dice talvolta che queste probabilità sono definite come rapporto tra il numero di *casi favorevoli* ed il numero di *casi possibili*.

Gli elementi di S sono anche detti eventi elementari e per $s \in S$ utilizzeremo la notazione $P(s) = P(\{s\})$.

Esempio 6. *La probabilità di ottenere due teste lanciando una moneta blu ed una rossa è* $1/4$.

2.2. Calcolo combinatorio

La necessità di stabilire delle cardinalità di vari insiemi ha portato allo sviluppo del *calcolo combinatorio*, le cui formule principali sono le seguenti:

Il numero di campioni ordinati ossia delle k-ple ordinate con ripetizione da n elementi, dette disposizioni con ripetizione, è dato da

$$D_{n,k}^{(r)} = n^k.$$

Il numero dei campioni senza ripetizione ordinati ossia delle k-ple ordinate senza ripetizione da n elementi, dette disposizioni senza ripetizione, è dato da

$$D_{n,k} = n(n-1) \cdot \dots \cdot (n-k+1) = (n)_k.$$

Il numero delle sottopopolazioni, ossia delle k-ple non ordinate senza ripetizione da n elementi, dette combinazioni senza ripetizione, è dato dal coefficiente binomiale

$$C_{n,k} = \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}.$$

Il numero delle sottopopolazioni con ripetizione, ossia delle k-ple non ordinate con ripetizione da n elementi, dette combinazioni con ripetizione, è dato da

$$C_{n,k}^{(r)} = \binom{n+k-1}{k-1}.$$

Il numero delle permutazioni di n elementi è dato da

$$P_n = D_{n,n} = n!.$$

Il numero di ripartizioni in sottopopolazioni di $k_1, k_2, \dots, k_r$ elementi di un insieme di n elementi, con $k_1 + k_2 + \dots + k_r = n$, è dato dal coefficiente multinomiale

$$C_{n,(k_1,k_2,\dots,k_r)} = \frac{n!}{k_1!k_2!\dots k_r!}.$$

Esempio 7. *Calcoliamo la probabilità di uscita di un numero (diciamo il* 23*) su una certa ruota nel lotto (in cui si estraggono senza reinserimento* 5 *numeri da* 90*). Se* A *è l'evento che esce il* 23 *Si può prendere come insieme* S *l'insieme delle disposizioni di* 90 *elementi a* 5 *a* 5*, e poi contare i casi favorevoli all'evento. Si ha:*

$$P(A) = \frac{5 \quad D_{89,4}}{D_{90,5}} = \frac{5 \quad 89! \quad 85!}{85! \quad 90!} = \frac{5}{90} = \frac{\binom{89}{4}}{\binom{90}{5}}.$$

Esempio 8. *La probabilità di due volte la faccia* 6 *lanciando due dadi è* 1/36*.*

Osservazione 1. *Ad un'osservazione più accurata, gli eventi descritti nei due esempi precedenti andrebbero meglio specificati; infatti non abbiamo chiarito se i numeri del lotto siano estratti insieme o uno dopo l'altro, così come non abbiamo detto se i dadi siano distinguibili (ad esempio colorati) o totalmente indistinguibili. Questo ha ripercussioni sulla scelta di* S*, per decidere se in esso occorra distinguere l'ordine o meno. Consideriamo ad esempio i due dadi: se li consideriamo distinguibili si avranno* $D^{(r)}_{6,2} = 36$ *possibili disposizioni con ripetizioni altrimenti dovremmo considerare le* $C^{(r)}_{6,2} = 21$ *combinazioni con ripetizione. Non vi è nessun ragionamento elementare che permette di scegliere logicamente tra queste due possibilità e quindi occorre sciogliere l'ambiguità con qualche ragionamento aggiuntivo. In primo luogo, la meccanica suggerisce che la colorazione dei dadi non dovrebbe influenzarne il moto, quindi nulla dovrebbe cambiare tra dadi con colori diversi o uguali; in secondo luogo, l'esperienza di molti esperimenti suggerisce che i due dadi vadano comunque considerati diversi, in modo che* 36 *è la cardinalità appropriata per* S*.*

Queste ed altre osservazioni ci portano a fare un'ipotesi che manterremo per tutto lo sviluppo successivo: **nel mondo macroscopico tutti gli oggetti si comportano come se fossero distinguibili**. *La stessa ipotesi non viene mantenuta nel mondo microscopico, ad esempio dalla statistica di Bose-Einstein, ma di questo non ci occupiamo per ora.*

Una conseguenza di questa ipotesi è che nella teoria per il mondo macroscopico non utilizzeremo le dispozioni con ripetizione.

Un'altra conseguenza è che anche i numeri della tombola o del lotto vanno considerati distinguibili, sia che questi siano estratti insieme sia che siano estratti uno dopo l'altro, e questo è il motivo per cui non è necessario specificare questi dettagli. Tuttavia, quando l'estrazione è senza reinserimento, ossia nel caso delle combinazioni, il numero di configurazioni che viene a coincidere quando si ignora l'ordine è un fattor comune, quindi qui si possono usare indifferentemente combinazioni o dispozioni, a patto di essere consistenti tra numeratore e denominatore (come visto nell'esempio 7).

.

Esempio 9. *In estrazioni senza reinserimento da un'urna con n palline che ne contiene k di un certo tipo calcolare la probabilità che la prima estratta sia del tipo dato e la probabilità che lo sia la seconda estratta. Siano A_1 ed A_2 tali eventi e si noti che nel secondo non abbiamo speficicato quale fosse stata la prima estratta (che quindi possiamo assumere di non aver visto). Naturalmente, con S tale che $|S| = n$ si ha $P(A_1) = k/n$. Inoltre, assumendo che le palline siano numerate da 1 ad n e che le prime k siano del tipo dato e considerando*

$$S = \{(a_1, a_2)|a_i \in \{1, \ldots, n\}, i = 1, \ldots, 2, a_1 \neq a_2\}$$

si ha $|S| = D_{n,2} = n(n-1)$. Infine, $A_i = \{(a_1, a_2) \in S|a_i \in \{1, \ldots, k\}\}$ per cui $|A_i| = |A_2| = k(n-1)$ e $P(A_1) = P(A_2) = k/n$.

E' immediato estendere questo ragionamento per concludere che in estrazioni senza reinserimento (come ovviamente avviene anche in quelle con reinserimento) la probabilità di un evento alla i-sima estrazione se non sono note le precedenti è sempre la stessa.

2.3. Proprietà delle probabilità uniformi

Dalla definizione di probabilità uniforme discendono alcune proprietà elementari, di verifica immediata dalle proprietà delle frazioni:

Lemma 1. *(i) $P(\emptyset) = 0, P(S) = 1$*
(ii) per ogni $A \subseteq S$, $0 \leq P(A) \leq 1$;
(iii) per ogni $s \in S$, $P(s) = \frac{1}{|S|}$;
(iv) per ogni $A \subseteq B \subseteq S$, $P(A) \leq P(B)$.

In taluni casi è più semplice calcolare la probabilità della negazione di un evento A, ossia del suo complemento insiemistico $A^c = S \backslash A$. Si ha

Corollario 1. *(I) Per ogni evento $A \subseteq S$ si ha $P(A^c) = 1 - P(A)$;*
(II) in generale, se $A \subseteq B \subseteq S$ si ha che $P(B \backslash A) = P(B) - P(A)$.

A volte è più agevole dedurre la probabilità di certi eventi da altri per i quali la probabilità si deriva più facilmente. Come si vede dalle proprietà della cardinalità:

Lemma 2. *Per ogni $A, B \subseteq S$ si ha*
(1) $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
(2) se $A \cap B = \emptyset$ allora $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$
(1) se $A_i \cap A_j = \emptyset$ per ogni $i, j = 1, \ldots, n$, $i \neq j$, allora $P(\cup_{i=1}^n A_i) = \sum_{i=1}^n P(A_i)$

Esempio 10. *Ricalcoliamo la probabilità di uscita del* 23 *su una certa ruota nel lotto. Se* A *è l'evento che esce il* 23 *ed* A_i *è l'evento che il* 23 *esce all'i-sima estrazione, per* $i = 1, \ldots, 5$*, si ha che gli* A_i *sono disgiunti e* $P(A_i) = 1/90$*, per cui*

$$P(A) = P(\cup_{i=1}^5 A_i) = \sum_{i=1}^5 P(A_i) = 5/90$$

Per la probabilità dell'unione di n eventi anche non disgiunti si ha:

Lemma 3. *(Formula di inclusione-esclusione) Per ogni* $A_i \subseteq S$*,* $i = 1, \ldots, n$

$$P(\cup_{i=1}^n A_i) = \sum_{k=1}^n \sum_{\{i_1,\ldots,i_k\}\in I_{n,k}} (-1)^{k+1} P(A_{i_1} \cap \cdots \cap A_{i_k}), \tag{2.1}$$

ove $I_{n,k} = \{\{i_1, \ldots, i_k\} | i_j \in \{1, \ldots, n\}$ *per ogni* j, $\quad i_j \neq i_{j'}$ *per* $j \neq j'\}$.

Dimostrazione. Segue dalla parte (1) del Lemma 2 per induzione. Per $n = 2$ essa è equivalente infatti alla tesi. Supponiamo quindi valida la conclusione per ogni famiglia di al più $n - 1$ eventi. Di nuovo dalla parte (1) del Lemma 2 e dall'ipotesi di induzione si ha

$$\begin{aligned}
P(\cup_{i=1}^n A_i) &= P(\cup_{i=1}^{n-1} A_i \cup A_n) \\
&= P(\cup_{i=1}^{n-1} A_i) + P(A_n) - P(\cup_{i=1}^{n-1} A_i \cap A_n) \\
&= \sum_{k=1}^{n-1} \sum_{\{i_1,\ldots,i_k\}\in I_{n-1,k}} (-1)^{k+1} P(\cap_{j=1}^k A_{i_j}) + P(A_n) \\
&\quad - \sum_{k'=1}^{n-1} \sum_{\{i_1,\ldots,i_{k'}\}\in I_{n-1,k'}} (-1)^{k'+1} P(\cap_{j=1}^{k'} A_{i_j} \cap A_n) \\
&= \sum_{k=1}^{n} \sum_{\{i_1,\ldots,i_k\}\in I_{n,k}} (-1)^{k+1} P(A_{i_1} \cap \cdots \cap A_{i_k}).
\end{aligned}$$

L'ultima uguaglianza vale avendo posto $k' = k-1$, da cui $-(-1)^{k'+1} = (-1)^{k+1}$, in quanto i termini con $n \notin \{i_1, \ldots, i_k\}$ vengono dalla prima sommatoria, quelli con $k > 1$ ed $n \in \{i_1, \ldots, i_k\}$ vengono dalla seconda ed il termine con $k = 1$ ed $i_1 = n$ è $P(A_n)$. □

Si noti che la dimostrazione precedente è basata unicamente sulla parte (1) del Lemma 2.

Esempio 11. *In 3 lanci di una moneta, se* $A = \{$*esce almeno una testa*$\}$ *e* $A_i = \{$*esce testa all'i-simo lancio*$\}$*, si ha* $A = \cup_{i=1}^3 A_i$*. Si può applicare la* (2.1) *e per questo basta osservare che per* $i, j \in \{1, \ldots, 3\}$ *diversi*

tra loro

$$P(A_i) = 4/8, \quad P(A_i \cap A_j) = 2/8 \text{ e } P(A_1 \cap A_2 \cap A_3) = 1/8$$

come si ottiene facilmente dalla scelta di un appropriato spazio di probabilità finito per ogni evento. Si ottiene quindi $P(A) = 7/8$.

Esempio 12. *Collocando a caso* n *palline numerate da* 1 *ad* n *in* n *urne anch'esse numerate, una per urna, calcoliamo la probabilità che nessuna pallina sia al posto giusto. Indichiamo con* B *tale evento. Si può passare all'evento complementare ed usare la* (2.1). *Osservando poi che se* A_i *è l'evento che l'i-sima pallina è al suo posto allora* $P(\cap_{i=1}^k A_i) = \frac{1}{n(n-1)\dots(n-k+1)} = \frac{(n-k)!}{n!}$ *allora per la probabilità dell'evento* B *è possibile dare una formula esplicita:*

$$P(B) = 1 - \sum_{k=1}^{n} (-1)^{k+1} \binom{n}{k} \frac{(n-k)!}{n!} = 1 - \sum_{k=1}^{n} (-1)^{k+1} \frac{1}{k!}.$$

2.4. Indipendenza

La teoria della probabilità esposta finora, basata sulla definizione di probabilità uniformi, era costituita essenzialmente di conteggi di cardinalità di insiemi, e, a parte la terminologia, non si discostava molto dalla teoria degli insiemi. C'è però un concetto intuitivo la cui traduzione nell'ambito della teoria le conferisce uno sviluppo automono. Si tratta dell'indipendenza che noi percepiamo tra vari eventi, ad esempio tra i risultati di lanci successivi di una moneta o di un dado (a patto che siano stati opportunamente mescolati tra un lancio e l'altro).

Per capire come inserire tale concetto all'interno della teoria consideriamo un esempio semplice: in due lanci successivi di una moneta il conteggio ci dice che la probabilità di due teste è 1/4, che risulta quindi uguale a 1/2 moltiplicato per 1/2. In altre situazioni che riteniamo indipendenti si verifica la stessa proprietà per cui è naturale porre la definizione seguente. Come al solito, queste erano riflessioni euristiche e da qui comincia la teoria.

Definizione 2. *(i) due eventi* $A, B \subseteq S$ *si dicono indipendenti se*

$$P(A \cap B) = P(A)P(B); \tag{2.2}$$

(ii) n *eventi* $A_i \subseteq S$, $i = 1, \dots, n$ *si dicono (collettivamente) indipendenti se per ogni sottofamiglia* $J \subseteq \{1, \dots, n\}$ *di indici,*

$$P(\cap_{i \in J} A_i) = \prod_{i \in J} P(A_i).$$

Esempio 13. *Nel lancio di un dado, se* A *è l'evento che esce un pari,* B *l'evento che esce un numero minore o uguale a* 2 *e* C *l'evento che esce un numero minore o uguale a* 3, *allora* $P(A) = 1/2$, $P(B) =$

$1/3$, $P(C) = 1/2$ e $P(A \cap B) = P(A \cap C) = 1/6$ per cui A e B sono indipendenti e A e C non lo sono.

Il concetto di indipendenza è però molto utile non quando si deve verificare l'indipendenza dalla definizione, come nell'ultimo esempio, ma quando l'indipendenza si deriva da qualche altra informazione e si utilizza la formula (2.2), ossia $P(A \cap B) = P(A)P(B)$, per calcolare $P(A \cap B)$ dagli altri due valori.

In taluni casi l'indipendenza di certi eventi si può desumere da un risultato teorico, come per l'indipendenza dei complementi nel prossimo teorema, ma più spesso è la situazione che si sta modellizzando che suggerisce l'indipendenza di certi eventi: così per esempio eventi relativi a mazzi di carte mescolati diversi o a diverse estrazioni con reinserimento sono da ritenersi indipendenti e sarebbe utile poter sfruttare questa informazione senza dover verificare l'indipendenza all'interno del modello. In altre parole, sarebbe comodo sapere a priori che esiste uno spazio di probabilità in cui ci sono eventi indipendenti con probabilità qualsiasi, in modo che esso può fare da modello per la nostra situazione. Dimostreremo un teorema abbastanza generale quando avremo esteso il concetto di probabilità (vedi Teorema 4).

Esempio 14. *Due lanci ripetuti di dado sono indipendenti, quindi se A indica l'uscita di due 3 e A_i, $i = 1, 2$, indica l'uscita del 3 all'i-simo dado, allora $A = A_1 \cap A_2$ e $P(A) = P(A_1)P(A_2) = \frac{1}{36}$.*

Esempio 15. *Anche n lanci ripetuti di dado sono collettivamente indipendenti, quindi se A indica l'uscita del 3 in tutti i dadi e A_i, $i = 1, \ldots, n$, indica l'uscita del 3 all'i-simo dado, allora $P(A) = \prod_{i=1}^{n} P(A_i) = \frac{1}{6^n}$.*

Vediamo ora che l'indipendenza collettiva di eventi implica l'indipendenza collettiva di parte degli eventi con i complementari degli altri.

Teorema 1. *Dati eventi $A_1, \ldots, A_n \subseteq S$ collettivamente indipendenti in uno spazio di probabilità (S, P), indicando con $A_i^1 = A_i$ e con $A_i^0 = A_i^c$, si ha che per ogni $\alpha = (\alpha_1, \ldots, \alpha_n) \in \{0, 1\}^n$, gli eventi $A_1^{\alpha_1}, \ldots, A_n^{\alpha_n}$ sono collettivamente indipendenti.*

Dimostrazione. Una dimostrazione si può fare per induzione su n.

Per $n = 2$ verifichiamo prima che l'affermazione è vera per $\alpha = (1, 0)$, ossia per $A_1 = A_1^1$ e $A_2^c = A_2^0$. Si ha che, essendo $A_1 \cap A_2 \subseteq A_1$, vale

$$\begin{aligned} P(A_1 \cap A_2^c) &= P(A_1 \backslash (A_1 \cap A_2)) \\ &= P(A_1) - P(A_1 \cap A_2) \\ &= P(A_1) - P(A_1)P(A_2) \\ &= P(A_1)(1 - P(A_2)) = P(A_1)P(A_2^c) \end{aligned}$$

ove si è usato che $P(A_1 \cap A_2) = P(A_1)P(A_2)$ per la supposta indipendenza.

Per il resto della dimostrazione basta utilizzare più volte quanto ora verificato. Se scambiamo il ruolo di A_1 e A_2 otteniamo la tesi per $\alpha = (0,1)$, e poi partendo dall'indipendenza di A_1 e A_2^c si ottiene quella per $\alpha = (0,0)$.

Ora supponiamo che la tesi sia vera fino ad $n-1$ e verifichiamola per n. Nella definizione di indipendenza collettiva si considerano anche i sottinsiemi di indici e se $k \leq n-1$ e $\{i_1, \ldots, i_k\} = J \subseteq \{1, \ldots, n\}$ dalla indipendenza collettiva di $A_{i_1}, \ldots, A_{i_k}$ discende, per l'ipotesi di induzione su n anche quella di $A_{i_1}^{\alpha_{i_1}}, \ldots, A_{i_k}^{\alpha_{i_k}}$ per ogni $(\alpha_{i_1}, \ldots, \alpha_{i_k}) \in \{0,1\}^k$. Quindi rimane solo da verificare la fattorizzazione per $A_1^{\alpha_1}, \ldots, A_n^{\alpha_n}$. Si può procedere con una seconda induzione sul numero m di zeri di α. Se $m = 0$ la fattorizzazione vale per ipotesi e supponiamo che valga quando ci sono al più $m-1$ zeri. Si consideri ora $\alpha = (\alpha_1, \ldots, \alpha_n)$ con m zeri e supponiamo, per semplicità di notazione e senza perdita di generalità , che $\alpha_n = 0$; si ha che la famiglia $A_1^{\alpha_1}, \ldots, A_{n-1}^{\alpha_{n-1}}, A_n^1$ è tale che il suo vettore α ha solo $m-1$ zeri e quindi per essa vale la fattorizzazione:

$$\begin{aligned} P(\cap_{i=1}^{n-1} A_i^{\alpha_i} \cap A_n^1) &= \prod_{i=1}^{n-1} P(A_i^{\alpha_i}) P(A_n^1) \\ &= P(\cap_{i=1}^{n-1} A_i^{\alpha_i}) P(A_n^1), \end{aligned}$$

ove la seconda uguaglianza è vera per l'ipotesi di induzione su n. Ma allora $\cap_{i=1}^{n-1} A_i^{\alpha_i}$ e A_n^1 sono indipendenti, per cui, per la verifica fatta per $n = 2$, anche $\cap_{i=1}^{n-1} A_i^{\alpha_i}$ e A_n^0 sono indipendenti. Ne segue che anche per m zeri si ha:

$$\begin{aligned} P(\cap_{i=1}^{n} A_i^{\alpha_i}) &= P(\cap_{i=1}^{n-1} A_i^{\alpha_i} \cap A_n^1) \\ &= P(\cap_{i=1}^{n-1} A_i^{\alpha_i}) P(A_n^1) \\ &= \prod_{i=1}^{n-1} P(A_i^{\alpha_i}) P(A_n^n) \\ &= \prod_{i=1}^{n} P(A_i^{\alpha_i}), \end{aligned}$$

ove la terza uguaglianza segue dall'ipotesi di induzione su n.

□

Esempio 16. *Se A indica l'uscita di almeno una testa in 10 lanci di una moneta ed A_i l'uscita di testa all'i-simo lancio, allora gli A_i sono collettivamente indipendenti e $A = \cup_{i=1}^{10} A_i$; ma gli eventi non sono disgiunti e quindi il calcolo con la formula di inclusione-esclusione è*

piuttosto laborioso. Tuttavia, $A^c = \cap_{i=1}^{10} A_i^c$ *e dall'indipendenza collettiva si ha* $P(A^c) = \prod_{i=1}^{10} P(A_i^c) = (\frac{1}{2})^{10}$*, così che* $P(A) = 1 - 1/2^{10} = 1023/1024$.

Facciamo una pausa per riassumere le regole che abbiamo visto per calcolare probabilità. Per calcolare la probabilità di un evento A si può provare a:

(1) contare gli elementi di A e di S;

(2) provare a passare a A^c;

(3) vedere A come unione, ossia $A = \cup_{i=1}^{n} B_i$ per certi B_i, e poi

(3_1) se B_i sono disgiunti si ha $P(A) = \sum_{i=1}^{n} P(B_i)$,

(3_2) se B_i non sono disgiunti si può provare ad usare la formula di inclusione-esclusione, in particolare per n piccolo;

(4) vedere A come intersezione, ossia $A = \cap_{i=1}^{n} B_i$ per certi B_i, e poi

(4_1) se B_i sono collettivamente indipendenti si ha $P(A) = \prod_{i=1}^{n} P(B_i)$,

(4_2) se B_i non sono collettivamente indipendenti non abbiamo ancora una formula adeguata.

Esercizio 6. *In una vicenda che dette origine a molti di questi calcoli, un incallito giocatore, Chevalier De Méré, scrisse nel 1654 a Pascal chiedendogli se l'uscita di almeno un* 6 *in* 4 *lanci di dado avesse la stessa probabilità dell'uscita di almeno un doppio* 6 *in* 24 *lanci di due dadi. Si racconta che il De Méré avesse perso una grossa somma assumendo che in entrambi i casi si trattasse di 'due probabilità su tre' di vincere. Pascal rispose al De Méré, poi scrisse a sua volta a Fermat e questo fu l'inizio della teoria che stiamo presentando. Calcolare le probabilità di questi eventi.*

Con i metodi precedenti si può anche scrivere in forma esplicita la probabilità che escano esattamente k teste in n lanci di una moneta. Scriviamo ora l'espressione in forma ancora più generale.

Esempio 17. *Supponiamo di effettuare* n *esperimenti indipendenti tali che in ciascuno la probabilità di successo sia un certo valore* $p \in [0,1]$*, ad esempio potrebbe essere* $p = 1/6$ *se per successo intendessimo l'uscita del* 3 *in un dado e così via. Se* $\mathcal{P}(k,n,p)$ *indica la probabilità di esattamente* k *successi su* n *prove indipendenti ognuna con probabilità di successo* p *ed* A_i *indica il successo alla i-sima prova si ha:*

$$\begin{aligned}
\mathcal{P}(k,n,p) &= P(\cup_{J\subseteq\{1,\ldots,n\},|J|=k}(\cap_{j\in J} A_j \cap \cap_{j\in J^c} A_j^c)) \\
&= \sum_{J\subseteq\{1,\ldots,n\},|J|=k} P(\cap_{j\in J} A_j \cap \cap_{j\in J^c} A_j^c) \\
&= \sum_{J\subseteq\{1,dots,n\},|J|=k} \prod_{j\in J} P(A_j) \prod_{j\in J^c} P(A_j^c) \\
&= \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}
\end{aligned}$$

Ci si riferisce a queste probabilità chiamandole distribuzione binomiale o di Bernoulli di parametri n e p od usando il simbolo $B(n, p)$.

Nel caso delle monete siamo interessati alla distribuzione di Bernoulli $B(n, 1/2)$. L'espressione ora ottenuta permette di fare un passo formale verso la soluzione del problema 1 posto all'inizio, ma ancora calcolare queste probabilità nel caso di 1000 monete non sarebbe agevole e non sapremmo nemmeno bene con cosa confrontare i valori così ottenuti.

2.5. Utilizzo della probabilità

Cominciamo dalla seconda questione: abbiamo visto alcuni ragionamenti che conducono al calcolo di probabilità e forse è il momento di tentare una prima connessione tra i valori di tali probabilità e la realtà. Non abbiamo ancora abbastanza strumenti per una discussione approfondita, ma possiamo fare alcune osservazioni.

1) E' ragionevole aspettarsi che un evento che ha probabilità 1% si verifichi circa 1 volta su 100 esperimenti indipendenti. Dopo tutto la probabilità che si realizzi esattamente una volta, data dalla distribuzione di Bernoulli $B(100, \frac{1}{100})$, è

$$\mathcal{P}(1, 100, \frac{1}{100}) = 100 \frac{1}{100^1} (\frac{99}{100})^{99} \sim \frac{1}{e} \sim 37\%$$

che quindi è abbastanza grande per poter procedere.

Esercizio 7. *Se non vi sembra abbastanza grande stimate la probabilità che un evento di probabilità* 1% *si verifichi* $0, 1$ *o* 2 *volte su* 100 *prove indipendenti: interpretando la frase circa 1 volta come l'evento che l'evento originale si realizzi* $0, 1$ *o* 2 *volte vediamo che la probabilità di questo è 'vicina' al* 100%.

Analogamente, eventi di probabilità $1/m$ si verificheranno circa 1 volta ogni m prove indipendenti (con alta probabilità).

Alla luce di questo è ragionevole affermare che se individuiamo un evento A *a priori*, ossia prima che sia effettuato l'esperimento che ne verificherà il realizzarsi o meno, e se la probabilità di A è circa $1/m$ con m grande ($m = 50, 100, 1000$), allora sarà sorprendente (tanto più quanto minore è la probabilità) vedere A realizzato già alla prima di queste prove.

Si possono trarre due conclusioni. Innanzitutto, ci sono eventi di probabilità piccola che noi tendiamo a considerare difficilmente realizzabili. In effetti, ci sono costantemente eventi di probabilità talmente bassa che vengono regolarmente ignorati (tipo l'arrivo di un grande meteorite). Poi si deve osservare che tale giudizio di irrilevanza va fatta non nel senso di irrealizzabilità o meno, ma nel senso di realizzabilità anch'essa con probabilità alta o bassa.

2) D'altra parte se abbiamo 100 eventi disgiunti di probabilità ognuno 1% segue dal Lemma 2 che la probabilità dell'unione è 100%, ossia uno di questi accade di sicuro. Una cosa di questo tipo accade per esempio nella tombola: ogni numero ha probabilità 1/90, ma in ogni estrazione viene estratto un numero.

Questa osservazione si può leggere così : *a posteriori*, ossia dopo che un esperimento è stato realizzato, possiamo selezionare eventi che avevano probabilità (a priori!) piccolissima e che si sono realizzati.

Esercizio 8. *Calcolare la probabilità che 10 lanci successivi di un dado (quindi indipendenti) risultino in una successione data di facce, per esempio* (1234565432).

I calcoli a priori vengono definiti **probabilità** ed in questo ambito siamo riusciti a dare un senso ai nostri calcoli, mentre quelli a posteriori (in cui rientrano i calcoli relativi all'esempio 1 sulle monete) vengono definiti **statistica** e per questo la nostra analisi è ancora insufficiente.

Osservazione 2. *Le riflessioni di questo paragrafo sembrano coincidere con una frase di Cicerone, che dice che gettando degli schizzi di colore a caso sul muro sarà molto facile osservare dei tratti che assomiglino ad una faccia, ma sarà assai difficile che questa possa essere quella della Venere di Milo.*

2.6. Stime di Probabilità e statistica

I risultati del capitolo precedente permettono di scrivere formalmente varie probabilità di interesse nel problema delle monete. Per esempio la probabilità di esattamente k teste su 1000 lanci di una moneta è

$$\begin{aligned}\mathcal{P}(k, 1000, 1/2) &= \binom{1000}{k}(\frac{1}{2})^{1000} \\ &= \frac{1000!}{k!(1000-k)!}.\end{aligned}$$

Con un calcolatore oggi è possibile ottenere una buona approssimazione di questo valore, ma nel '700 era necessario cercarne un'approssimazione analitica; oggi questa puo' comunque essere utile quando il numero di prove sia molto grande (10^7 è fuori dalla portata di programmi come MatLab) oppure per stime rapide quando non si abbia un computer a disposizione.

Il prossimo teorema introduce un'approssimazione analitica del fattoriale, detta di Stirling, esplicitata a meno di una costante che verrà determinata nel seguito.

Teorema 2. *Esiste una costante $c \in \mathbb{R}$ tale che per ogni $n \in \mathbb{N}$ si ha*

$$e^{\frac{1}{12(n+1)}} e^c n^{n+1/2} e^{-n} \leq n! \leq e^{\frac{1}{12n}} e^c n^{n+1/2} e^{-n}$$

per cui

$$\lim_{n\to\infty} \frac{n!}{e^c n^{n+1/2} e^{-n}} = 1.$$

Dimostrazione. Studiamo

$$d_n = \log(n!) - [(n+1/2)\log(n) - n];$$

si ha

$$d_n - d_{n+1} = (n+1/2)\log(\frac{n+1}{n}) - 1.$$

Da

$$\log(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \dots$$

e

$$\log(\frac{1}{1-x}) = x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \dots,$$

si ha che

$$\log(\frac{1}{2}\frac{1+x}{1-x}) = x + \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + \dots$$

Per cui, ponendo $\frac{n+1}{n} = \frac{1+\frac{1}{2n+1}}{1-\frac{1}{2n+1}}$ si ha

$$\begin{aligned} d_n - d_{n+1} &= (n+1/2)(\frac{2}{2n+1} + \frac{2}{3(2n+1)^3} + \dots) - 1 \quad (2.3) \\ &= \frac{1}{3(2n+1)} + \frac{1}{5(2n+1)^4} + \dots \geq 0. \end{aligned}$$

Dalla (2.3) si ha che

$$\begin{aligned} d_n - d_{n+1} &\leq \sum_{k=1} (\frac{1}{(2n+1)^2})^k \\ &= \frac{1}{(2n+1)^2} \frac{1}{3(1-\frac{1}{(2n+1)^2})} \\ &= \frac{1}{3(4n^2+4n)} \quad (2.4) \\ &= \frac{1}{12n^2+12n} \\ &= \frac{1}{12n} - \frac{1}{12(n+1)}. \end{aligned}$$

Pertanto la successione $d_n - \frac{1}{12n}$ è crescente in n. poiché da (2.3) la successione d_n è decrescente in n, quindi limitata, si ha che $d_n - \frac{1}{12n}$ è anch'essa limitata, ed essendo crescente, ha limite: esiste $c \in \mathbb{R}$ tale che

$$\begin{aligned} \lim_{n\to\infty} d_n - \frac{1}{12n} &= \lim_{n\to\infty} d_n \\ &= \sup_n d_n - \frac{1}{12n} = c; \end{aligned}$$

inoltre, $d_n \leq c + \frac{1}{12n}$ per ogni $n \in \mathbb{N}$.

D'altra parte, segue da da (2.3) che

$$\begin{aligned} d_n - d_{n+1} &\geq \frac{1}{3(2n+1)^2} \\ &= \frac{1}{12n^2+12n+3} \\ &\geq \frac{1}{12(n+1)} - \frac{1}{12(n+2)}. \end{aligned}$$

essendo $12(n+1)(n+2) \geq 12n^2+12n+3$. Quindi $d_n - \frac{1}{12(n+1)}$ è decrescente e

$$\begin{aligned} c &= \lim_{n\to\infty} d_n - \frac{1}{12(n+1)} \\ &= \inf_n d_n - \frac{1}{12(n+1)} = \lim_{n\to\infty} d_n. \end{aligned}$$

Per cui $c + \frac{1}{12(n+1)} \leq d_n$. Passando agli esponenziali di queste quantità si ottiene la tesi. □

Ora possiamo fare qualche stima più esplicita, eccetto che per la costante c.

Esempio 18. *La probabilità di esattamente $n/2$ teste su n lanci di una moneta, assumendo n pari per semplicità, soddisfa:*

$$\begin{aligned} \mathcal{P}(n/2, n, 1/2) &= \frac{n!}{((n/2)!)^2}\frac{1}{2^n} \\ &= \frac{e^c n^{n+1/2} e^{-n}}{e^{2c}(n/2)^n e^{-n\frac{n}{2}}}\frac{1}{2^n} = \frac{2}{\sqrt{n}e^c} \end{aligned}$$

e, tenuto conto degli errori,

$$\mathcal{P}(n/2, n, 1/2) = \frac{2}{\sqrt{n}e^c} e^{S(n)}$$

con $|S(n) \leq \frac{1}{3(n+1)}$ per $n \geq 4$. Il lettore è invitato a verificare questa stima.

Non avendo ancora una stima per $\bar{c} = e^c$ possiamo principalmente concludere per ora che $\mathcal{P}(n/2, n, 1/2)$ tende a 0 in n ed è dell'ordine di $1/\sqrt{n}$.

Per p generico si semplificano altrettanto bene le stime quando $k = np$ è intero:

$$\mathcal{P}(np, n, p) = \frac{n!}{(np)!((1-p)n)!} p^{np}(1-p)^{n(1-p)} \approx \frac{1}{\sqrt{n}e^c\sqrt{p(1-p)}}$$

Le stime per altri varori di k non si semplificano altrettanto bene, ma si può almeno confrontare i vari termini con quelli che abbiamo appena stimato, che per motivi che vedremo vengono definiti 'centrali'.

LEMMA 4. *Per ogni $n \in \mathbb{N}$ e per ogni $p \in [0,1]$ $\mathcal{P}(k,n,p)$ è strettamente crescente in k per $k < p(n+1)-1$, è strettamente decrescente per $k > p(n+1)-1$, così che*

$$\arg\max_k \mathcal{P}(k,n,p) = [p(n+1)-1, p(n+1)] \cap \mathbb{N}$$

DIMOSTRAZIONE. Si ha

$$\begin{aligned} \mathcal{P}(k+1,n,p) &= \binom{n}{k+1} p^{k+1}(1-p)^{n-k-1} \\ &= \frac{n-k}{k+1}\frac{p}{1-p}\mathcal{P}(k,n,p) \end{aligned}$$

quindi la monotonia di $\mathcal{P}(k,n,p)$ dipende da $\frac{n-k}{k+1}\frac{p}{1-p}$. Le monotonie discendono dal fatto che $\frac{n-k}{k+1}\frac{p}{1-p} > 1$, e questo a sua volta vale se e solo se $p(n+1)- > k$. In particolare, se $p(n+1) \in \mathbb{N}$, $\mathcal{P}(p(n+1)-1,n,p) = \mathcal{P}(p(n+1),n,p)$ così che $\arg\max_k \mathcal{P}(k,n,p) = \{p(n+1)-1, p(n+1)\}$, come richiesto. □

ESEMPIO 19. *Nel caso delle monete l'andamento di $\mathcal{P}(k,n,1/2)$ in k dipende solo dai coefficienti binomiali;* $\arg\max_k \mathcal{P}(k,n,1/2)$ *dipende dalla parità di $n = \{(n+1)/-1, (n+1)/2\}$*

2.7. Teorema di De Moivre-Laplace

Abbiamo visto che il termine centrale, ossia più probabile, di una distribuzione binomiale relativa ad n prove vale circa $c/\sqrt{n}$. poiché i termini vicini non saranno molto diversi con un numero di termini dell'ordine di $\sqrt{n}$ si otterrà una probabilità quasi piena. Questa osservazione è specificata molto meglio e resa rigorosa nel seguente teorema, che enunciamo e dimostriamo solo nel caso particolare di $p = 1/2$. Si utlizzerà la funzione gaussiana $e^{-x^2/2}$ definita per $x \in$ *mathbbR*.

TEOREMA 3 (Teorema di De Moivre-Laplace per $p = 1/2$). . *Per ogni $a_1, a_2 \in \mathbb{R}$, $0 \le a_1 \le a_2$ si ha che*

$$Q_n(a_1,a_2) = \sum_{n/2+\frac{a_1}{2}\sqrt{n} \le j \le n/2+\frac{a_2}{2}\sqrt{n}} \mathcal{P}(j,n,1/2)$$

soddisfa

$$\lim_{n\to\infty} Q_n(a_1,a_2) = \int_{a_1}^{a_2} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2} dx.$$

DIMOSTRAZIONE. Per semplicità esponiamo la dimostrazione per n pari; se n è dispari la dimostrazione richiede solo modifiche irrilevanti.

Poniamo $n = 2\nu$ e, per ogni $k = 0, 1, 2, \ldots$

$$\begin{aligned}
\alpha_k = \mathcal{P}(\nu + k, 2\nu, 1/2) &= \binom{2\nu}{\nu + k}\frac{1}{2^{2\nu}} \\
&= \frac{(2\nu)!}{(\nu + k)!(\nu - k)!}\frac{1}{2^{2\nu}} \\
&= \frac{(2\nu)!}{(\nu + k - 1)!(\nu - k + 1)!}\frac{1}{2^{2\nu}}\frac{\nu - k + 1}{\nu + k} \\
&= \alpha_{k-1}\frac{\nu - k + 1}{\nu + k} \\
&= \alpha_0\frac{(\nu - k + 1)(\nu - k + 2)\ldots\nu}{(\nu + k)(\nu + k - 1)\ldots(\nu + 1)} \\
&= \alpha_0\frac{(1 - \frac{k-1}{\nu})(1 - \frac{k-2}{\nu})\ldots 1}{(1 + \frac{k}{\nu})(1 + \frac{k-1}{\nu})\ldots(1 + \frac{1}{\nu})}.
\end{aligned}$$

Ricordiamo che

$$\log(1 + x) = x - x^2/2 + x^3/3 + \cdots = x + R(x)$$

con

$$|R(x)| \leq x^2/2 + x^3/3 + \cdots \leq 1/2\sum_{k=2}^{\infty} x^k = \frac{x^2}{2(1 - x)} < x^2$$

per $2(1 - x) > 1$, ossia per $x < 1/2$.

Quindi $1 + x = e^{x+R(x)}$, per cui

$$\begin{aligned}
\alpha_k &= \alpha_0\frac{e^{-(\frac{k-1}{\nu}+\cdots+\frac{1}{\nu})}}{e^{(\frac{k}{\nu}+\cdots+\frac{1}{\nu})}}e^{\bar{R}(k)} \\
&= \alpha_0 e^{-\frac{k^2}{\nu}}e^{\bar{R}(k)} \\
&= \alpha_0 e^{-\frac{2k^2}{n}}e^{\bar{R}(k)}, \qquad (2.5)
\end{aligned}$$

con $|\bar{R}(k)| \leq 2kR(\frac{k}{\nu}) \leq 2\frac{k^3}{\nu^2} = 2\frac{2^3k^3}{n^2}$. Dalla formula di Stirling

$$\alpha_0 = \frac{2}{\sqrt{n}e^c}e^{S(n)}$$

con $|S(n)| \leq \frac{1}{3(n+1)}$.

Risulta quindi che $\alpha_k \approx c_1e^{-c_2k}$, con c_1 e c_2 costanti, così che possiamo stimarlo tramite l'integrale della funzione $c_1e^{-c_2x}$. Per far ciò si noti che la funzione $e^{-\frac{x^2}{2}}$ è decrescente per $x \geq 0$. Dalla monotonia discende che per $k \geq 1$:

$$\int_{k-1}^{k} e^{-\frac{x^2}{\nu}}dx \geq e^{-\frac{k^2}{\nu}} \geq \int_{k}^{k+1} e^{-\frac{x^2}{\nu}}dx$$

. Per cui

$$\begin{aligned} Q_n(a_1,a_2) &= \sum_{n/2+\frac{a_1}{2}\sqrt{n}\le j\le n/2+\frac{a_2}{2}\sqrt{n}} \mathcal{P}(j,n,1/2) \\ &= \sum_{\frac{a_1}{2}\sqrt{n}\le k\le \frac{a_2}{2}\sqrt{n}} \mathcal{P}(n/2+k,n,1/2) \\ &\ge \frac{2}{\sqrt{n}}\int_{\lceil \frac{a_1}{2}\sqrt{n}\rceil}^{\lfloor \frac{a_2}{2}\sqrt{n}\rfloor+1} e^{-c}e^{-\frac{2x^2}{n}}dx e^{S(n)}e^{-\max|\bar{R}(k)|} \end{aligned}$$

in cui $\lfloor t\rfloor$ indica la parte intera di t, $\lceil t\rceil = \lfloor t\rfloor + 1$, e il massimo è preso in k con $\frac{a_1}{2}\sqrt{n} \le k \le \frac{a_2}{2}\sqrt{n}$. poiché l'integrando è positivo si può stimare restringendo ulteriormente l'intervallo di integrazione a $[a_1\sqrt{n}+1, a_2\sqrt{n}]$ se $a_1\sqrt{n}+1 \le a_2\sqrt{n}$, oppure all'insieme vuoto. Per ottenere la funzione $e^{-y^2/2}$ poniamo $y = \frac{2x}{\sqrt{n}}$ ottenendo

$$\begin{aligned} Q_n(a_1,a_2) &\ge \left(\int_{a_1}^{a_2} e^{-c}e^{-\frac{y^2}{2}}dy - \int_{a_1}^{a_1+2/\sqrt{n}} e^{-c}e^{-\frac{y^2}{2}}dy\right) e^{-\max|\bar{R}(k)|+S(n)} \\ &\ge \left(\int_{a_1}^{a_2} e^{-c}e^{-\frac{y^2}{2}}dy - e^{-a_1^2}e^{-c}\frac{2}{\sqrt{n}}\right) e^{\frac{-a_2^3}{\sqrt{n}}-\frac{1}{3(n+1)}} \end{aligned}$$

essendo

$$\max|\bar{R}(k)| \le \max_{\frac{a_1}{2}\sqrt{n}\le k\le \frac{a_2}{2}\sqrt{n}} \frac{2^3k^3}{n^2} = \frac{-a_2^3}{\sqrt{n}}.$$

Nella corrispondente stima dall'alto occorre separare il termine centrale, che non è dominato dall'integrale se $j = n/2$:

$$\begin{aligned} Q_n(a_1,a_2) &\le \left(\int_{\lfloor a_1\sqrt{n}\rfloor-1}^{\lfloor a_2\sqrt{n}\rfloor} e^{-c}e^{-\frac{x^2}{\nu}}e^{E([x])}dx + 1\right) e^{-c}\frac{2}{\sqrt{n}}e^{-\frac{1}{3(n+1)}} \\ &\le \left(e^{\frac{a_2^3}{\sqrt{n}}}\int_{a_1-\frac{2}{\sqrt{n}}}^{a_2} e^{-c}e^{-\frac{y^2}{2}}dy + e^{-c}\frac{2}{\sqrt{n}}\right) e^{-\frac{1}{3(n+1)}}. \end{aligned}$$

Prendendo il limite per n che diverge si ottiene che

$$\lim_{n\to\infty} Q_n(a_1,a_2) = \int_{a_1}^{a_2} e^{-c}e^{-x^2/2}dx. \tag{2.6}$$

Rimane da determinare il valore di e^c. Si verificherà in modo probabilistico nel seguito, utilizzando il risultato (2.6) qui dimostrato, che $e^c = \sqrt{2\pi}$, da cui la tesi.

□

Osservazione 3. *Lo stesso risultato vale per $a_1 < a_2 < 0$ per la simmetria della funzione gaussiana e della distribuzione di Bernoulli per $p = 1/2$. Per cui, per l'additività dell'integrale rispetto al dominio di integrazione, il risultato di De Moivre Laplace vale per qualsiasi*

$a_1, a_2 \in \mathbb{R}$ con $a_1 \leq a_2$. poiché $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx = 1$ segue per simmetria che $\int_0^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-c} e^{-x^2/2} dx = \frac{1}{2} = \sum_{n/2 \leq j} \mathcal{P}(j, n, 1/2) + \frac{c}{\sqrt{n}}$ per qualche $c \in \mathbb{R}$. Quindi

$$\begin{aligned}
\lim_{n\to\infty} Q_n(a, +\infty) &= \lim_{n\to\infty} \sum_{n/2+a/2\sqrt{n} \leq j} \mathcal{P}(j, n, 1/2) \\
&= \lim_{n\to\infty} 1/2 - \frac{c}{\sqrt{n}} - \sum_{n/2 \leq j \leq n/2+a/2\sqrt{n}} \mathcal{P}(j, n, 1/2) \\
&= 1/2 - \int_0^a \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2} dx \\
&= \int_a^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2} dx
\end{aligned}$$

Essendo valido questo ragionamento anche per valori negativi, si conclude che il Teorema di De Moivre Laplace vale per qualsiasi a_1, a_2 in $\bar{\mathbb{R}}$ esteso.

Osservazione 4. *Si noti che nella dimostrazione del teorema si è ottenuto non solo il limite richiesto, ma anche delle stime dall'alto e dal basso di $Q_n(a_1, a_2)$. Gli errori sono però solitamente piccoli, dell'ordine di $e^{\frac{a_2^3}{\sqrt{n}}}$ moltiplicativamente e $\frac{2}{\sqrt{2\pi n}}$ additivamente che in pratica è possibile trascurarli senza alterare sensibilmente l'approssimazione di Q. Pertanto abitualmente, occasionalmente senza prestare sufficiente cura, si approssima $Q_n(a_1, a_2)$ con $\int_{a_1}^{a_2} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2} dx$.*

Questa tecnica ci permette quindi di approssimare i valori relativi alla probabilità che il numero di successi in prove indipendenti con probabilità di successo 1/2 sia compresa in un certo intervallo di valori, che, come ora vedremo, può suggerire una risposta molto precisa al problema iniziale sulle monete.

Come si era visto, la probabilità di ogni singolo risultato è piccola se il numero di prove è grande, e quindi non permette di per sè di valutare la plausibilità di quel numero di teste. Invece la probabilità di un numero di teste minore o uguale ad un dato valore $\bar{k}$ cambia drasticamente, essendo attorno ad 1/2 per $\bar{k}$ vicino ad $n/2$ e vicino a 0 per $\bar{k}$ molto piccolo. Quindi questa probabilità ci può permettere di distinguere tra i risultati plausibili e quelli che non lo sono.

Esempio 20. *Se si sono ottenute 460 teste su 1000 lanci di una moneta, la probabilità di ottenere un numero di testi minore o uguale a quello ottenuto è stimabile come segue. Se S_{1000} è il numero di teste ottenute in 1000 monete, vogliamo stimare*

$$P(S1000 \leq 460) = Q_n(-\infty, a)$$

per un certo a. La determinazione di a va fatta imponendo $1000/2 + \frac{a}{2}\sqrt{1000} = 460$, *ossia* $a = \frac{460-1000/2}{\sqrt{1000}/2} \approx -2,53$. *Ora si puo' ottenere dalle tavole della funzione gaussiana l'approssimazione*

$$P(S1000 \leq 460) \approx \int_{-\infty}^{-2,53} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2} dx \approx 0,006 = 0,6\%.$$

Se ne conclude che 460 *è un numero di teste assolutamente inaccettabile su* 1000 *lanci di una moneta e che già per questo numero di teste avremmo dovuto considerare l'esperimento come truccato!*

Osservazione 5. *E' chiaro che per decidere delle nostre reazioni in base ai calcoli precedenti dovremmo fissare delle soglie sotto le quali consideriamo una probabilità troppo piccola e quindi il risultato anomalo. Storicamente, allo scopo di scrivere delle tavole utilizzabili in molte situazioni, si sono considerate i valori del* 5% *come soglia per il dubbio sulla correttezza di un esperimento e dell'*1% *per la ragionevole assunzione che l'esperimento non è corretto*

Esercizio 9. *Verificare che su* 1000 *monete avremmo dovuto avere dubbi (soglia* 5%*) con meno di* 474 *teste e ragionevole certezza dell'anomalia del risultato (soglia* 1%*) con meno di* 463 *teste.*

CAPITOLO 3

PROBABILITÀ SU INSIEMI FINITI

3.1. Spazi di probabilità su insiemi finiti

Nel caso delle probabilità uniformi ci trovavamo di fronte ad alternative tutte equivalenti. Tuttavia negli calcoli successivi abbiamo preso un valore p qualsiasi ed abbiamo ricavato formule (come la distribuzione di Bernoulli) in dipendenza di questo p.

Viene quindi naturale di considerare delle probabilità che non vengano da conteggi di insiemi, ma siano semplicemente dei valori in $[0, 1]$ soddisfacenti a certe regole, anche perché così si possono fare modelli per situazioni in cui non ci sono elementi da contare (tipo la probabilità che un tiro faccia centro o che una misura ecceda di una certa frazione il valore vero).

Rimaniamo comunque per ora su un insieme finito e richiediamo per la probabilità che soddisfi alcune delle proprietà che abbiamo verificato essere vere nel caso uniforme. In particolare, scorrendo quanto verificato nel caso uniforme, si vede che la proprietà principale da cui derivano tutte le altre è la (2) del lemma 2, ossia quella secondo cui se $A \cap B = \emptyset$ allora $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$. Assumiamola quindi come ipotesi:

Definizione 3. *Dato un insieme finito S si dice probabilità (finita) su S ogni funzione P definita sui sottinsiemi di S tale che:*
(1) $P(S) = 1$
(2) per ogni $A \subseteq S$, $P(A) \in [0, 1]$*;*
(3) se $A \cap B = \emptyset$ *allora* $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.

Si possono ricavare tutte le proprietà viste per le probabilità uniformi valgono anche per le probabilità finite. Così in particolare vale la formula della distribuzione di Bernoulli, adesso definita per ogni p anche non razionale.

Anche se la definizione precedente sembra assai generale i modelli che determina sono facilmente identificabili:

Esercizio 10. *Verificare che P è una probabilità su un insieme finito S se e solo se esiste una funzione non negativa f su S tale che per ogni evento $A \subseteq S$, $P(A) = \frac{\sum_{s \in S} f(s)}{\sum_{s \in S} f(s)}$.*

Osservazione 6. *Finora abbiamo visto quindi due definizioni: prima la probabilità come* **rapporto tra numero di casi favorevoli e**

possibili, *ed ora una definizione* **assiomatica** *di probabilità. Discuteremo di altre due definizioni nel proseguimento.*

3.2. Indipendenza

Il prossimo risultato garantisce l'esistenza di uno spazio in cui si possono trovare eventi indipendenti di probabilitåassegnata. Questo non garantisce l'esistenza contemporanea di altri eventi di probabilità data, ma già è sufficiente per molte situazioni.

Teorema 4. *(Esistenza di eventi collettivamente indipendenti). Dati valori $p_1, \ldots, p_n \in [0,1]$ esiste uno spazio di probabilità (S, P) ed eventi $A_1, \ldots, A_n \subseteq S$ collettivamente indipendenti e tali che $P(A_i) = p_i$.*

Dimostrazione. Consideriamo

$$S = \{(\alpha_1, \ldots, \alpha_n) : \alpha_j \in \{0,1\}, j = 1, \ldots, n\}$$

e poniamo

$$A_i = \{(\alpha_1, \ldots, \alpha_n) \in S : \alpha_i = 1\}$$

e

$$P((\alpha_1, \ldots, \alpha_n)) = \prod_{j=1}^{n} p_j^{\alpha_j} (1 - p_j)^{1-\alpha_j}.$$

Chiaramente $P \geq 0$ e

$$\sum_{(\alpha_1,\ldots,\alpha_n)\in S} P((\alpha_1, \ldots, \alpha_n)) = \sum_{(\alpha_1,\ldots,\alpha_n)\in S} \prod_{j=1}^{n} p_j = 1$$

per cui segue dall'esercizio 10 che (S, P) è uno spazio di probabilità. Inoltre per ogni $J \subseteq \{1, \ldots, n\}$

$$P(\cap_{i\in J} A_i) = \sum_{(\alpha_1,\ldots,\alpha_n)\in \cap_{i\in J} A_i} \prod_{j=1}^{n} p_j = \prod_{i\in J} p_i$$

per cui $P(A_i) = p_i$ e $P(\cap_{i\in J} A_i) = \prod_{i\in J} p_i = \prod_{i\in J} P(A_i)$ come richiesto. □

Per ulteriori eventi oltre a quelli indipendenti la cui esistenza è garantita dal teorema occorrono naturalmente ulteriori verifiche.

Esempio 21. *Un esempio di uno spazio di probabilità con tre eventi $A_i, i = 1, 2, 3$ collettivamente indipendenti, tali che $P(A_i) = p_i$ ed un evento A_4 che sia incompatibile con $\cap_{i=1}^{3} A_i$ ed indipendente da A_1 si può ottenere ponendo S come sopra con $n = 4$ e, per esempio,*

$$P((\alpha_1, \ldots, \alpha_4)) = \prod_{j=1}^{4} p_j^{\alpha_j} (1 - p_j)^{1-\alpha_j}.$$

per $(\alpha_1, \ldots, \alpha_4) \neq (1,1,1,1), (1,1,0,1)$ *e*

$$P(1,1,1,1) = 0 \quad e \quad P(1,1,0,1) = p_1p_2(1-p_3)p_4 + p_1p_2p_3(1-p_4).$$

Può essere $P(A_4) = (1 - p_1p_2p_3)/2$*?*

3.3. Probabilità condizionate

In alcune situazioni si vuol calcolare la probabilità di un evento quando si sa che un altro si è già realizzato. Un buon sistema per trattare questa situazione è restringere l'ambito dei possibili risultati all'evento che si sa essere realizzato rendendone 1 la probabilità. Questo risulta naturale se l'evento già realizzato aveva probabilità positiva (ché altrimenti ci si immette in una considerazione forse non priva di senso, ma che richiede certamente un dettagliato chiarimento):

Definizione 4. *Dato uno spazio di probabilità* (S, P) *e due eventi* $A, B \subseteq S$*, con* $P(B) \neq 0$*, si dice probablità condizionata di* A *dato* B *il valore*

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}. \tag{3.7}$$

Esempio 22. *Nel lancio di un dado, se* $A = \{3\}$ *e* $B = \{dispari\}$ *(nello stesso lancio),* $P(A|B) = \frac{1/6}{1/2} = \frac{1}{3}$ *è la probabilità che sia uscito il* 3 *sapendo che è uscito un dispari.*

Come già accaduto per l'indipendenza, talvolta è conveniente 'dedurre' il valore della probabilità condizionata dal problema ed usare (3.7) per ricavare uno degli altri termini. Questo pone gli stessi problemi già discussi trattando dell'indipendenza: il valore della probabilità condizionata dovrebbe essere verificata dalla (3.7) prima di usarla. Tale verifica andrebbe fatta per esempio in astratto prima di usare l'espresssione in un caso concreto, ma in molte occasioni la verifica viene omessa e le probabilità condizionate vengono desunte direttamente dal problema. Il procedere senza una verifica teorica a volte crea difficoltà e rischia di condurre ad interpretazioni errate, ma una certa pratica evita comunque gli errori più grossolani.

Esempio 23. *Estraendo senza reinserimento da un'urna contenente* 3 *palline bianche e* 5 *rosse, che indicheremo schematicamente come* $|3B \quad 2R|$*, ed indicando con* B_i *e* R_i *gli eventi che escano una pallina bianca o rossa, rispettivamente, alla i-sima estrazione si ha che* $P(B_1) = 3/8$*,* $P(R_2|B_1) = 5/7$ *da cui* $P(B_1 \cap R_2) = 18/56$*.*

Dalla conoscenza di tutte le probabilità condizionate a certi eventi è poi possibile risalire alle probabilità non condizionate degli eventi stessi. A tale scopo diciamo che una famiglia di insiemi $B_1, \ldots, B_n \subseteq S$ è una partizione di S se

(a) $B_i \cap B_j = \emptyset$ se i è diverso da j;

(b) $\cup_{i=1}^{n} B_i = S$.

Vale ora il seguente risultato, talvolta detto teorema delle probabilità totali o delle probabilità composte.

TEOREMA 5 (Teorema delle probabilità totali). *Se B_i, $i = 1, \ldots, n$, costituiscono una partizione di S con $P(B_i)$ diverso da 0 per ogni i, allora per ogni evento A si ha*

$$P(A) = \sum_{i=1}^{n} P(A|B_i)P(B_i). \tag{3.8}$$

DIMOSTRAZIONE. Dalla definizione di probabilità condizionata si ha

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^{n} P(A|B_i)P(B_i) &= \sum_{i=1}^{n} \frac{P(A \cap B_i)}{P(B_i)} P(B_i) \\ &= \sum_{i=1}^{n} P(A \cap B_i) \\ &= P(\cup_{i=1}^{n} A \cap B_i) = P(A) \end{aligned} \tag{3.9}$$

in cui le due ultime uguaglianze seguono, la prima dal fatto che i B_i sono disgiunti e quindi così sono gli $A \cap B_i$, e la seconda dal fatto che $\cup_{i=1}^{n} B_i = S$.

□

ESEMPIO 24. *Nella situazione e con le notazioni dell'ultimo esempio relativo alle estrazioni da $|3B \quad 2R|$ si ha:*

$$P(R_2) = P(R_2|B_1)P(B_1) + P(R_2|R_1)P(R_1) = \frac{5}{7} \cdot \frac{3}{8} + \frac{4}{7} \cdot \frac{5}{8} = \frac{5}{8}.$$

Si noti che $P(R_2) = P(R_1)$, come già in precedenza argomentato.

Questo teorema è molto utile, ma a volte bisogna saper trovare la partizione giusta a cui condizionare:

ESEMPIO 25. *In un gioco ci sono tre porte e dietro ad una sola vi è un premio. Un concorrente sceglie una porta senza aprirla, poi dal conduttore gli viene aperta una porta senza premio ed offerta la possibilità di cambiare la sua scelta (necessariamente nell'unica porta finora non menzionata). E' conveniente cambiare o la cosa è irrilevante in quanto comunque aveva scelto una porta a caso?*

Diciamo di giudicare sulla base della probabilità di trovare il premio, che vogliamo massima, e fissiamo due strategie: cambiare o non cambiare (al momento della scelta). Trovandoci ad aver scelto la prima porta, per calcolare le probabilità di trovare il premio la cosa migliore sembra essere scegliere la seguente partizione: se a è la porta scelta, siano A_a l'evento che il premio è in a ed A_a^c il suo complemento (che

necessariamente formano una partizione dell'insieme dei possibili esiti, quali che essi siano). Ora, detto V l'evento che trovo il premio, si ha: $P(V) = P(V|A_a)P(A_a) + P(V|A_a^c)P(A_a^c)$. Naturalmente, visto che la posizione del premio è casuale (o quantomeno ignota al concorrente) $P(A_a) = 1/3$. Nella strategia di cambiare, $P(V|A_a) = 0$ e $P(V|A_a^c) = 1$ e viceversa nella strategia di non cambiare, per cui quando si cambia $P(V) = 2/3$ e non cambiando $P(V) = 1/3$. Quindi conviene cambiare.

Si può usare una combinazione del teorema delle probabilità totali con la definizione di probabilità condizionata per calcolare probabilità condizionate non direttamente evidenti.

Esercizio 11. *Calcolare la probabilità che il secondo numero estratto nella tombola (quindi senza reinserimento) sia il 30 sapendo che il primo estratto è pari.*

3.4. Formula di Bayes

La formula presentata in questa sezione permette di tornare indietro, ossia calcolare la probabilità che avevano certi eventi già realizzati (ma del cui esito non abbiamo informazione).

Esempio 26. *Supponiamo di avere due urne, $|3N \quad 2R|$ e $|2N \quad 8R|$, e di usare il seguente procedimento di estrazione: scelgo un'urna a caso e poi da questa estraggo una pallina a caso. Se la pallina è rossa, qual è la probabilità che l'urna estratta sia la prima?*

In questa situazione conosciamo le probabilità iniziali di scelta dell'urna e poi le probabilità condizionate di prendere una certa pallina scelta l'urna, ma appunto il problema chiede di tornare indietro.

Teorema 6 (Formula di Bayes). *Data una partizione Se B_i, $i = 1, \ldots, n$, con $P(B_i) > 0$, ed un evento A sottinsieme di un insieme S, con $P(A) \neq 0$, si ha*

$$P(B_1|A) = \frac{P(A|B_1)P(B_1)}{\sum_{i=1}^{n} P(A|B_i)P(B_i)} \tag{3.10}$$

Dimostrazione. Dalla definizione di probabilità condizionata e dalla formula delle probabilità totali si ha

$$\frac{P(A|B_1)P(B_1)}{\sum_{i=1}^{n} P(A|B_i)P(B_i)} = \frac{P(A \cap B_1)}{P(A)} = P(B_1|A).$$

□

Esempio 27. *Nell'esempio precedente siano A l'evento che viene scelta l'urna $|3N \quad 2R|$ e B l'evento che viene scelta l'altra urna; A e B formano una partizione. Se R è l'evento che è stata estratta una*

pallina rossa si risponde al problema determinando $P(A|R)$. E dalla formula di Bayes:

$$P(A|R) = \frac{\frac{2}{5} \cdot \frac{1}{2}}{\frac{2}{5} \cdot \frac{1}{2} + \frac{5}{10} \cdot \frac{1}{2}} = \frac{4}{9}.$$

Statistica Bayesiana

E' possibile utilizzare la formula di Bayes anche per un'analisi statistica diversa da quelle a cui si è accennato finora. Per distinguere i due approcci quest'ultimo viene detto frequentista o classico (e lo riprenderemo nella seconda parte di queste note) ed il primo, a cui accenneremo ora, Bayesiano.

Supponiamo che si faccia il seguente esperimento: le due scatole degli esempi precedenti sono scelte con probabilità a noi non note p_A e p_B, $p_A + p_B = 1$, poi viene estratta una pallina dalla scatola scelta e ci viene mostrata. L'idea della statistica Bayesiana è quella di determinare in qualche modo delle probabilità iniziali, o a priori, per la scelta di A e B e poi aggiornarle con la formula di Bayes. Visto che non sappiamo nulla del valore di p_A un'ipotesi sensata è di considerare inizialmente le due scatole come equiprobabili, per cui si parte dalla probabilità a priori P_0 tale che $P_0(A) = P_0(B) = \frac{1}{2}$. Poi avendo a disposizione un dato (che la pallina estratta è rossa) si aggiorna la nostra stima delle probabilità in

$$P_1(A) = P_0(A|R) = \frac{4}{9}$$

e $P_1(B) = P_0(B|R) = \frac{5}{9}$. Naturalmente la procedura può essere iterata: se viene ripetuto l'esperimento descritto sopra con le stesse probabilità a noi non note, quindi dopo il reinserimento delle palline estratte, e la pallina mostrata è di nuovo rossa (indichiamo con R_2 l'evento corrispondente) ora si può aggiornare la stima delle probabilità partendo da P_1:

$$\begin{aligned} P_2(A) &= P_1(A|R_2) \\ &= \frac{P_1(R_2|A)P_1(A)}{P_1(R_2|A)P_1(A) + P_1(R_2|B)P_1(B)} \\ &= \frac{\frac{2}{5} \cdot \frac{4}{9}}{\frac{2}{5} \cdot \frac{4}{9} + \frac{5}{10} \cdot \frac{5}{9}} = \frac{16}{41} \end{aligned}$$

Correttamente $\frac{16}{41} < \frac{4}{9}$ perché l'uscita di un'altra pallina rossa rafforza la convinzione che sia scelta più frequentemente la scatola B che contiene più rosse e che quindi A abbia una probabilità minore di quanto pensavamo prima.

3.5. Alcuni calcoli di probabilita' in genetica

Esempio 28. *Qual è la probabilità che nasca un figlio biondo da due genitori castani?*

Per poter procedere la questione deve essere formulata in termini scientifici e saranno poi necessari alcuni dati, che immaginiamo più facilmente reperibili della frequenza di figli biondi da genitori castani. La teoria rivelatasi più adeguata è quella genetica (che qui esponiamo in forma molto semplificata) in cui si assume:

1. ogni individuo ha, relativamente al carattere in oggetto, due alleli;
2. tali alleli possono essere o b per il carattere biondo o C per il carattere castano;
3. b è un allele recessivo, C dominante per cui il fenotipo (ossia la forma espressa del carattere da parte dell'individuo portatore di due alleli è sempre castano salvo quando i due alleli sono entrambi b);
4. (legge di Hardy-Weinberg) se p_b è la frequenza di alleli b in una popolazione (ossia il rapporto tra il numero di loci con allele b rispetto al numero totali di loci, quest'ultimo essendo due volte il numero di individui della popolazione) allora la frequenza di alleli C sarà $p_C = 1-p_b$ e la frequenza di individui con alleli bb sarà $p_{bb} = p_b \cdot p_b$ e di quelli con alleli CC sarà $p_{CC} = p_C \cdot p_C$.

Sulla base di questi elementi, ed osservando che se un individuo è scelto a caso allora la probabilità di un certo evento coincide con la sua frequenza nella popolazione, è possibile determinare molte probabilità relativamente ai genotipi ed ai fenotipi di una popolazione in un dato momento.

Esempio 29. *La probabilità che un individuo sia eterozigote (ossia abbia due alleli diversi) è* $p_{bC} = 1 - p_{bb} - p_{CC} = 2p_b p_C$.

La probabilità che un individuo castano sia eterozigote è data dalla probabilità condizionata che l'individuo sia eterozigote dato che è castano: indicando con $\bar{C}$ *quest'ultimo evento, la probabilità è quindi*

$$P(bC|\bar{C}) = \frac{P(bC \cap \bar{C})}{P(\bar{C})} = \frac{2p_b p_C}{1-p_b^2} = \frac{2p_b(1-p_b)}{1-p_b^2} = \frac{2p_b}{1+p_b}.$$

Quest'ultima probabilità si può vedere come una applicazione, in un caso molto semplice, del teorema di Bayes in quanto è immediato desumere le probabilità di un certo fenotipo dato il genotipo (che sono peraltro 0 *o* 1*) e qui si richiede la probabilità condizionata inversa (esercizio).*

Tuttavia nel problema 2 dobbiamo anche prendere in considerazione la riproduzione in quanto siamo interessati a questioni di discendenza. Un'ipotesi ragionevole relativamente alla riproduzione è che

5. ogni figlio viene generato scegliendo due genitori scelti a caso (eventualmente lo stesso!) ed il suo genotipo è generato scegliendo a caso un allele da ogni genitore.

Questa ipotesi non è molto realistica per le popolazioni umane, ma sembra più ragionevole per animali inferiori e poi è molto semplice. Prima di procedere osserviamo che c'è però un problema di coerenza tra quest'ultima ipotesi e le precedenti (questo problema fu portato verso il 1920 al matematico Hardy dal biologo Punnet e dette in seguito luogo alla legge che porta il nome di Hardy): se ad una certa generazione valgono le ipotesi 1-4 e la riproduzione segue l'ipotesi 5 si manterranno le condizioni 1-4 anche alla generazione successiva?

Per questa verifica si usa il teorema delle probabilità totali. Se indichiamo con $P_{\alpha\beta}$, $M_{\alpha\beta}$ e $F_{\alpha\beta}$, gli eventi che il padre, la madre o il figlio rispettivamente, hanno genotipo $\alpha\beta$ si ha:

$$\begin{aligned} P(F_{bb}) &= \sum_{\alpha,\beta,\alpha',\beta'=b,C} P(F_{bb}|P_{\alpha,\beta}\cap M_{\alpha',\beta'})P(P_{\alpha,\beta}\cap M_{\alpha',\beta'}) \\ &= P(P_{b,b}\cap M_{b,b}) + \frac{1}{2}P(P_{b,C}\cap M_{b,b}) \\ &\qquad +\frac{1}{2}P(P_{b,b}\cap M_{b,C}) + \frac{1}{4}P(P_{b,C}\cap M_{b,C}) \\ &= p_b^4 + 2\frac{1}{2}2p_b^3(1-p_b) + \frac{1}{4}4p_b^2(1-p_b)^2 \\ &= p_b^2 = P(P_{bb}). \end{aligned} \tag{3.11}$$

La stessa cosa si può verificare per gli altri genotipi, per cui le condizioni 1-4 risultano in effetti stabili rispetto alla riproduzione modellizzata da 5.

Siamo ora in grado di fornire una risposta al problema 2. Se indichiamo con $F_{\bar{b}}$ ($F_{\bar{C}}$) l'evento che il figlio è biondo (o castano) ed analogamente denotiamo gli eventi che il padre o la madre hanno un certo fenotipo, una soluzione al problema viene data dal calcolo di

$$P(F_{\bar{b}}|P_{\bar{C}}\cap M_{\bar{C}}) = P(F_{bb}|P_{\bar{C}}\cap M_{\bar{C}}).$$

Dalla definizione di probabilità condizionate si ha:

$$\begin{aligned} P(F_{bb}|P_{\bar{C}}\cap M_{\bar{C}}) &= \frac{P(F_{bb}\cap P_{\bar{C}}\cap M_{\bar{C}})}{P(P_{\bar{C}}\cap M_{\bar{C}})} \\ &= \frac{\sum_{\alpha,\beta,\alpha',\beta'=b,C \text{ ma non uguali a bb}} P(F_{bb}\cap P_{\alpha,\beta}\cap M_{\alpha',\beta'})}{\sum_{\alpha,\beta,\alpha',\beta'=b,C \text{ ma non uguali a bb}} P(P_{\alpha,\beta}\cap M_{\alpha',\beta'})}. \end{aligned}$$

L'indipendenza nella scelta dei genitori implica che

$$\sum_{\alpha,\beta,\alpha',\beta'=b,C \text{ ma non uguali a bb}} P(P_{\alpha,\beta}\cap M_{\alpha',\beta'}) = (1-p_b^2)^2.$$

Per il calcolo del numeratore possiamo utilizzare di nuovo la definizione di probabilità condizionata, osservando che solo una delle probabilità

condizionate è diversa da 0:

$$\begin{aligned}
& \sum_{\alpha,\beta,\alpha',\beta'=b,C \text{ ma non uguali a bb}} P(F_{bb} \cap P_{\alpha,\beta} \cap M_{\alpha',\beta'}) \\
= & \sum_{\alpha,\beta,\alpha',\beta'=b,C \text{ ma non uguali a bb}} P(F_{bb}|P_{\alpha,\beta} \cap M_{\alpha',\beta'})P(P_{\alpha,\beta} \cap M_{\alpha',\beta'}) \\
= & \frac{1}{4}4(1-p_b)^2p_b^2.
\end{aligned}$$

Per cui si ha

$$P(F_{bb}|P_{\bar{C}} \cap M_{\bar{C}}) = \frac{(1-p_b)^2p_b^2}{(1-p_b^2)^2} = \frac{p_b^2}{(1+p_b)^2}.$$

Ora rimane solo da determinare p_b. In effetti, sappiamo che la frequanza di (fenotipi) biondi è il 30% e che la probabilità di un genotipo puro bb è p_b^2. Assumendo che questi due valori siano uguali si ha $p_b = \sqrt{0.3}$.

Per cui $P(F_{bb}|P_{\bar{C}} \cap M_{\bar{C}}) = \frac{0,3}{(1+\sqrt{0.3})^2} \simeq 0,125$.

Anche se era ovvio che la probabilità di un figlio biondo dovesse essere minore per due genitori castani rispetto a due qualunque genitori, quantificare tale riduzione è un risultato per nulla immediato.

CAPITOLO 4

VARIABILI ALEATORIE FINITE

4.1. Variabili aleatorie

In alcuni problemi si è portati a considerare funzioni definite su uno spazio di probabilità .

Esempio 30. *Il numero di teste in* 100 *lanci di una moneta può essere visto come una funzione* $T_{100} : S \to \mathbb{R}$ *con* $S = \{0,1\}^{100}$ *che indica l'insieme dei possibili risultati del lancio di* 100 *monete, indicando testa con* 1 *e croce con* 0*, definita da*

$$T_{100}(a_1, \ldots, a_{100}) = \sum_{i=1}^{100} a_i;$$

ove su S *si considera la probabilità uniforme.*

Per distinguerla dalla teoria delle funzioni e per ricordare che stiamo parlando di fenomeni casuali, queste funzioni vengono chiamate in modo diverso:

Definizione 5. *Dato uno spazio di probabilità finito* (S, P) *ogni funzione* $X : S \to \mathbb{R}$ *è detta* **variabile aleatoria**.

Le variabili aleatorie costituiscono una generalizzazione del concetto di evento, infatti per ogni evento A in uno spazio di probabilità (S, P) la funzione indicatrice di $\mathbb{I}_A$ di A definita da

$$\mathbb{I}_A(s) = \begin{cases} 1 & \text{se } s \in A \\ 0 & \text{se } s \notin A \end{cases}$$

è una variabile aleatoria.

Spesso delle variabili aleatorie ci interessano i valori che esse possono assumere e le relative probabilità : denotiamo con $S_X = X(S) \subseteq \mathbb{R}$ il codominio di una variabile aleatoria X e per ogni $B \subseteq S_X$ con

$$\begin{aligned} P_X(B) &:= P(s \in S : X(s) \in B) \\ &= P(X^{-1}(B)) \\ &=: P(X \in B) \end{aligned}$$

la probabilità che X assuma valori in B. Conseguentemente, $P_X(x) = P_X(\{x\})$ indica la probabilità che X assuma il valore $x \in S_X$.

Lemma 5. *Per ogni variabile aleatoria finita* X*, la coppia* (S_X, P_X) *è uno spazio di probabilità finito detto* **distribuzione di** X.

Dimostrazione. Si ha:
(i) $P_X(S_X) = P(X^{-1}S_X) = P(S) = 1$
(ii) Per ogni $B \subseteq S_X$, $0 \leq P_X(B) \leq P(S) = 1$
(iii) Per ogni $B, C \subseteq S_X$, $B \cap C = \emptyset$,

$$\begin{aligned} P_X(B \cup C) &= P(X^{-1}(B \cup C)) \\ &= P(X^{-1}(B) \cup X^{-1}(C)) \\ &= P(X^{-1}(B)) + P(X^{-1}(C)) \\ &= P(B) + P(C) \end{aligned}$$

in cui la terza uguaglianza deriva, come sempre, dal fatto che gli eventi sono disgiunti e che quindi sono disgiunte le immagini inverse.

Infine, $|S_X| \leq |S| < \infty$. □

Osservazione 7. *Si noti che P_X risulta essere una probabilità proprio perché utilizziamo X^{-1} per trasportare P in P_X. Se $Z : T \to S$ fosse una fuzione a valori in uno spazio di probabilità (S, P) il trasporto nella direzione opposta dato da $P \circ Z$ non dà in generale uno spazio di probabilità perché le immagini di insiemi disgiunti non è detto che siano disgiunte.*

Se D indica una certa distribuzione e X è una variabile aleatoria si scrive $X \sim D$ (letto X ha distribuzione D) per indicare che X ha la distribuzione D. Ad esempio, se X è la la funzione identità su uno spazio di probabilità uniforme su $\{1, 2, \ldots, n\}$ indichiamo con $X \sim U(\{1, 2, \ldots, n\}) = U(n)$ il fatto la distribuzione di X è appunto lo spazio uniforme di partenza.

Poiché (S_X, P_X) è uno spazio di probabilità gran parte delle informazioni su X possono essere dedotte direttamente dalla sua distribuzione, tant'è che se due variabili aleatorie hanno la stessa distribuzione condividono gran parte delle proprietà . Per cui si pone:

Definizione 6. *Si dice che due variabili aleatorie X definita su (S_1, P_1) ed Y definita su (S_2, P_2) sono uguali in distribuzione, e si denota con $X =^d Y$, se $(S_X, P_X) = (S_Y, P_Y)$*

Da questo punto di vista sembra perfino che non sia necessario introdurre le variabili aleatorie, in quanto il loro studio si riconduce a quello di spazi di probabilità . Tuttavia, solo 'gran parte' delle proprietà dipendono dalla distributione, non tutte. In particolare, in qualunque modello di fenomeni reali si è interessati al valore assunto da una variabile aleatoria e non solo alla sua distribuzione; in questa direzione si osservi che variabili aleatorie uguali in distribuzione non sono necessariamente uguali, anzi possono essere sempre diverse:

Esempio 31. *Nel lancio di una moneta, la funzione indicatrice di testa $\mathbb{I}_T$ e la funzione indicatrice di croce $\mathbb{I}_C$ soddisfano $\mathbb{I}_T =^d \mathbb{I}_C$ ma $\mathbb{I}_T(s) \neq \mathbb{I}_C(s)$ per ogni $s \in S$; in altre parole, i guadagni di chi punta su testa sono opposti a quelli di chi punta su croce*

Come accaduto nell'ultimo esempio, capita di considerare due o più variabili aleatorie $X_1, X_2. \dots, X_n$ definite su uno stesso spazio di probabilità . Anche ogni combinazione $\phi(X_1, X_2, \dots, X_n)$ di queste determinata da una funzione $\phi : B \to \mathbb{R}$, con $B \subseteq \mathbb{R}^n$ tale che $S_{X_1} \times S_{X_2} \times \cdots \times S_{X_n} \subseteq B$, è una variabile aleatoria definita da

$$\phi(X_1, X_2, \dots, X_n)(s) = \phi(X_1(s), X_2(s), \dots, X_n(s)).$$

Così $X_1 + X_2$, $4X_1$ e X_1^2 sono variabili aleatorie sullo stesso spazio di X_1 e X_2.

La determinazione della distribuzione di

$$Y = \phi(X_1(s), X_2(s), \dots, X_n(s))$$

può essere laboriosa, come si intravede dall'esempio seguente:

Esempio 32. *Se X_1 e X_2 sono i risultati del lancio di due dadi e $X_1 + X_2$ è la loro somma, con una certa pazienza si puo' ricavare la distribuzione di $X_1 + X_2$ dalle probabilità dei risultati dei lanci dei due dadi. In particolare, $S_{X_1+X_2} = \{2, 3, \dots, 12\}$ e*

$$P_{X_1+X_2}(s) = \begin{cases} \frac{s-1}{36} & se\ s \leq 6 \\ \frac{12-s+1}{36} & se\ s \geq 7 \end{cases}$$

Alcune variabili aleatorie notevoli sono elencate di seguito:

Esempio 33. *Su un insieme finito $S \in \mathbb{R}$ la variabile aleatoria X che può assumere ognuno dei valori di S con la stessa probabilità è detta uniforme e si indica $X \sim U(\{1, \dots, n\})$ se $|S| = n$, per cui $P(X = k) = 1/n$ per $k = 1, \dots, n$.*

Esempio 34. *Il numero di successi T_n in n prove indipendenti ognuna con probabilità di successo p è una variabile aleatoria che si dice Binomiale o Bernoulli di parametri (n, p) e si indica generalmente $T_n \sim B(n, p)$, per cui $P(T_n = k) = p^k(1-p)^{n-k}$ per $k = 0, \dots, n$.*

4.2. Valore atteso

Introduciamo ora una quantità , utilizzabile per l'analisi di variabili alatorie, che può essere giustificata in vari modi.

Esempio 35. *Storicamente fu descritta per la prima volta relativamente al gioco dei punti, in cui due giocatori A e B si disputano 24 gettoni a testa o croce: vince il primo che arriva a 2 vittorie. Naturalmente esiste un modo equo di dividersi i gettoni senza giocare: 12 ognuno. Se però A, che scommette su testa, ha vinto la prima partita, come ci si può dividere la posta senza giocare ulteriormente? Se si decidesse di fermarsi dopo un'ulteriore partita allora se in questa esce ancora testa A prende 24 gettoni, e se esce croce ci si puo' dividere 12 gettoni a testa; quindi dopo una vittoria di A è ragionevole dare i 12*

ad A e dividersi gli altri 6 ciascuno, per cui A ha 18 gettoni. Si nota però che $18 = \frac{1}{2}24 + \frac{1}{2}12$. *Se invece si decidesse di finire il gioco la probabilità di A di vincere tutta la posta dato che è uscita una testa sarebbe* $P(T \cup CT) = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$ *e si nota che di nuovo* $18 = \frac{3}{4} \times 24$.

Esempio 36. *Supponiamo di scommettere sul risultato di un dado, vincendo 3 se esce il 6 ed altrimenti perdendo 1. In ogni partita la nostra vincita sarà quindi una variabile aleatoria* X *tale che* $X(6) = 3$ *e* $X(i) = -1$ *per ogni* $i = 1, \ldots, 5$. *Dopo* 60 *partite ci aspettiamo di aver vinto circa* 10 *partite e perse* 50, *con una vincita totale di* -20. *Si noti che*

$$-20 = 30 - 50 = 3 \times 10 - 1 \times 50 = 3\frac{60}{6} - 1\frac{60 \times 5}{6} = 60(3\frac{1}{6} - 1\frac{5}{6})$$

.

In questi ed in molti altri esempi compare quindi la quantità somma dei valori vinti moltiplicati per la probabilità di vincerli e questa quantità può essere quindi un modo di valutare l'esito di una variabile aleatoria. Per cui si pone:

Definizione 7. *Data una variabile aleatoria* X *definita su uno spazio di probabilità* (S, P) *si dice* **valore atteso** *o* **speranza matematica** *o aspettazione o valor medio di* X *il valore*

$$E(X) = M(X) = \sum_{s \in S} X(s)P(s). \tag{4.12}$$

Il valore atteso dipende solo dalla distribuzione di X:

Lemma 6.

$$E(X) = \sum_{x \in S_X} xP_X(x)$$

Dimostrazione.

$$\begin{aligned} E(X) &= \sum_{s \in S} X(s)P(s) \\ &= \sum_{x \in S_X} \sum_{s \in S : X(s) = x} xP(s) \\ &= \sum_{x \in S_X} xP_X(x) \end{aligned}$$

□

Esempio 37. *Il valore atteso del risultato* X *del lancio di un dado è :*

$$E(X) = \sum_{i=1}^{6} i\frac{1}{6} = 3,5.$$

L'esempio mostra che non sempre il valore atteso è un valore che può essere assunto dalla variabile aleatoria e mostra quindi che l'idea che rappresenti il valore 'che ci aspettiamo' è soltanto approssimativa e va specificata nei sensi che abbiamo indicato in precedenza.

Esempio 38. *Il valore atteso di una variabile aleatoria* $T_n \sim B(n,p)$ *è :*

$$E(T_n) = \sum_{k=0}^{n} k \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} = np.$$

Alcune proprietà elementari del valore atteso sono:

Lemma 7. *Se* $X_1, X_2, \ldots, X_n$ *sono variabili aleatorie su uno spazio di probabilità* (S,P) *e* $a_1, a_2, \ldots, a_n \in \mathbb{R}$ *sono costanti si ha che:*
(i) $E(a) = a$
(ii) $E(a_1X_1 + a_2X_2) = E(X_1) + E(X_2)$ *e pertanto*
(iii) $E(\sum_{i=1}^n a_iX_i) = \sum_{i=1}^n a_iE(X_i)$

Dimostrazione. (i) $E(a) = \sum_{s\in S} aP(s) = a$.
(ii)

$$\begin{aligned} E(a_1X_1 + a_2X_2) &= \sum_{s\in S}(a_1X_1 + a_2X_2)(s)P(s) \\ &= \sum_{s\in S}(a_1X_1(s) + a_2X_2(s))P(s) \\ &= \sum_{s\in S} a_1X_1(s)P(s) + \sum_{s\in S} a_2X_2(s)P(s) \\ &= E(X_1) + E(X_2). \end{aligned}$$

(iii) segue per induzione su n □

Esprimere una variabile aleatoria come somma di altre variabili può quindi condurre ad una drastica semplificazione del calcolo del valore atteso, come si vede dall'esempio seguente.

Esempio 39. *Se* $T_{1000} \sim B(1000, 1/2)$ *è il numero di teste in* 1000 *lanci di una moneta allora* $T_{1000} = \sum_{i=1}^{1000} X_i$ *con* X_i *la funzione indicatrice di testa all'i-simo lancio. Si ha che* $E(X_i) = 1/2$ *per ogni* i *e*

$$E(T_n) = E(\sum_{i=1}^{1000} X_i) = \sum_{i=1}^{1000} E(X_i) = 500.$$

Pertanto il valore atteso riproduce in questo caso correttamente l'idea di quello che 'ci aspettiamo', così come era stato assunto nelle discussioni iniziali ed anche utilizzato nel teorema di De Moivre-Laplace. Generalizzando si ottiene che se $T_n \sim B(n,p)$ *allora* $T_n = \sum_{i=1}^n X_i$ *con* $X_i \sim B(1,p)$. *Per cui* $E(X_i) = 1p - 0(1-p) = p$ *e* $E(T_n) = np$.

In questo calcolo la proprietà di indipendenza della distribuzione di Bernoulli non è stata utilizzata ed infatti il Lemma vale in generale per tutte le variabili aleatorie.

Esempio 40. *Se T_n è il totale di n estrazioni dalla tombola senza reinserimento allora $T_n = \sum_{i=1}^n X_i$, con X_i i-simo numero estratto. poiché*

$$E(X_i) = \sum_{j=1}^{90} \frac{j}{90} = \frac{91}{2}$$

per ogni $i \leq 90$, e $E(X_i) = 0$ per ogni $i > 90$, si ha

$$E(T_n) = \begin{cases} n\frac{91}{2} & se\ n \leq 90 \\ 90\frac{91}{2} & se\ n \geq 90. \end{cases}$$

Si noti il caso $n = 90$, in cui tutte le palline sono estratte e $T_{90} \equiv 90\frac{91}{2}$ con probabilità uno.

Ci sono altri modi per indicare un 'valore medio' di una variabile aleatoria, utili in particolari contesti. Tra questi vi è il centro o i centri delle probabilità :

Definizione 8. *Si dice* **mediana** *di una variabile aleatoria X definita su (S, P) ogni valore $m(X)$ tale che*

$$P(X \leq m(X)) \geq \frac{1}{2} \ e\ P(X \geq m(X)) \geq \frac{1}{2}.$$

Esempio 41. *Tutti i valori in $[3, 4]$ sono mediane del risultato del lancio di un dado.*

Esempio 42. *La mediana del numero T_n di teste in 100 lanci di una moneta è 50, come si vede per simmetria, mentre per 101 lanci è un qualunque numero in $[50, 51]$*

Come si è visto dagli esempi, la mediana non è necessariamente unica e può coincidere o meno con il valore atteso.

Definizione 9. *Si dice* **moda** *di una variabile aleatoria X ogni valore $mo(X)$ tale che per ogni $x \in S_X$*

$$P(X = mo(X)) \geq P(X = x).$$

E' moda di una variabile aleatoria $T_n \sim B(n, p)$ ogni valore in $[p(n+1) - 1, p(n+1)] \cap \mathbb{N}$ mentre tutti i valori possibili sono moda per le variabili aleatorie uniformi. La moda di una variabile aleatoria è utile solo in alcune situazioni: ad esempio, se si è obbligati a scommettere su uno solo dei risultati possibili di un esperimento casuale la moda permette di massimizzare le probabilità di vittoria.

Quando si osservano dei dati $\{x_1, \ldots, x_n\}$ dopo aver condotto un esperimento casuale è possibile definire lo spazio di probabilità $(S_{\mathbb{O}}, P_{\mathbb{O}})$,

che chiameremo empirico o campionario, in cui $S_{\mathbb{O}}$ è costituito dai valori osservati e $P_{\mathbb{O}}$ è determinato dalla frequenze, ossia

$$P_{\mathbb{O}}(x) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \mathbb{I}_{x_i=x}.$$

In tale spazio il valore atteso della variabile aleatoria identità I è la media empirica dei dati:

$$\begin{aligned} \mu = E(I) &= \sum_{x\in\{x_1,\ldots,x_n\}} xP_{\mathbb{O}}(x) \\ &= \sum_{x\in\{x_1,\ldots,x_n\}} x\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \mathbb{I}_{x_i=x} \\ &= \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i. \end{aligned}$$

La mediana di I è la mediana empirica $m = m(I)$ tale che $|\{i : x_i \leq m\}| \geq n/2$ e $|\{i : x_i \geq m\}| \geq n/2$. Si noti che le mediane empiriche si possono determinare ordinando (debolmente) le osservazioni x_i, che vengono in questo caso denotate con $\{x_{(1)}, \ldots, x_{(n)}\}$ con $x_{(1)} \leq \cdots \leq x_{(n)}$, e scegliendo poi un valore nell'intervallo (banale se n è dispari) $[x_{(\lfloor \frac{n+1}{2} \rfloor)}, x_{(\lceil \frac{n+1}{2} \rceil)}]$. La moda di I è la moda dei dati, ossia ogni valore $mo(I)$ che massimizza la frequenza di osservazione.

Esempio 43. *Con dati* $5.0, 3.5, 2.3, 5.0, 1.2, 1.6$ *risultano:* $\mu = 3.1, m \in [2.3, 3.5], mo = 5.0$.

Prima di condurre un esperimento è possibile valutare a priori le quantità empiriche appena descritte considerandole come funzioni di variabili aleatorie $X_1, \ldots, X_n$. In particolare la media empirica delle variabili aleatorie diviene

$$\bar{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$$

di cui si discuteranno varie proprietà nel seguito.

Per concludere la discussione sul valore atteso osserviamo che data una variabile aleatoria X ed una funzione $\Phi : S_X \to \mathbb{R}$, il risultato seguente sul cambiamento di variabili permette di semplificare il calcolo del valore atteso della variabile aleatoria $\Phi(X)$.

Teorema 7. *Data una variabile aleatoria* X *su* (S, P) *e* $\Phi : B \to \mathbb{R}$ *con* $S_X \subseteq B$ *si ha*

$$\begin{aligned} E(\Phi(X)) &= \sum_{\phi\in S_{\Phi(X)}} \phi P(\Phi(X) = \phi) \\ &= \sum_{x\in S_X} \Phi(x)P_X(x) \end{aligned}$$

DIMOSTRAZIONE. la prima uguaglianza discende dal Lemma 6. Per la seconda si ha

$$\begin{aligned} E(\Phi(X)) &= \sum_{s\in S} \Phi(X(s))P(s) \\ &= \sum_{x\in S_X} \sum_{s\in S:X(s)=x} \Phi(x)P(s) \\ &= \sum_{x\in S_X} \Phi(x)P_X(x) \end{aligned}$$

□

La prima espressione di $E(\Phi(X))$ data nel teorema richiede la determinazione di $(S_{\Phi(X)}, P_{\Phi(X)})$, mentre per la seconda espressione basta la distribuzione di X che può essere utilizzata per tutte le Φ.

Il valore atteso di una potenza di una variabile aleatoria X viene definito **momento di ordine** k di X ed in accordo con l'ultimo risultato vale $\sum_{x\in S_X} x^k P_X(x)$.

4.3. Indipendenza tra variabili aleatorie

E' stata sollevata nell'ultimo capitolo la questione della dipendenza tra variabili aleatorie. Per definire la mancanza di dipendenza estendiamo il concetto di indipendenza tra eventi. Per comprendere come realizzare questa estensione partiamo dall'esempio seguente.

Per semplificare la notazione, per variabili aleatorie $X_1, , \ldots, X_n$ definite su uno stesso spazio di probabilità (S, P) indicheremo con

$$\begin{aligned} &\{X_1 = x_1, X_2 = x_2, \ldots, X_n = x_n\} \\ &\qquad = \{s \in S : X_1(s) = x_1 \text{ e } X_2(s) = x_2 \text{ e } \ldots \text{ e } X_n(s) = x_n\}. \end{aligned}$$

ESEMPIO 44. *Se $X_i = \mathbb{I}_{A_i}$, con A_i eventi indipendenti in uno spazio di probabilità (S, P), allora*

$$\begin{aligned} P(\mathbb{I}_{A_1} = 1)P(\mathbb{I}_{A_2} = 1) &= P(A_1)P(A_2) \\ &= P(A_1 \cap A_2) \\ &= P(\mathbb{I}_{A_1}\mathbb{I}_{A_2} = 1) \\ &= P(\mathbb{I}_{A_1} = 1, \mathbb{I}_{A_2} = 1) \end{aligned} \tag{4.13}$$

ma abbiamo anche visto che

$$\begin{aligned} P(\mathbb{I}_{A_1} = 1)P(\mathbb{I}_{A_2} = 0) &= P(A_1)P(A_2^c) \\ &= P(A_1 \cap A_2^c) \\ &= P(\mathbb{I}_{A_1} = 1, \mathbb{I}_{A_2} = 0) \end{aligned} \tag{4.14}$$

e così via, di modo che

$$P(\mathbb{I}_{A_1} = i)P(\mathbb{I}_{A_2} = j) = P(\mathbb{I}_{A_1} = i, \mathbb{I}_{A_2} = j)$$

per ogni $i, j = 0, 1$.

Per definire l'indipendenza si può quindi generalizzare questa proprietà :

DEFINIZIONE 10. *n variabili aleatorie $X_1, , \ldots, X_n$ definite su uno spazio di probabilità (S, P) sono indipendenti se*

$$P(X_1 = x_1, X_2 = x_2, \ldots, X_n = x_n) = \prod_{i=1}^{n} P(X_i = x_i) \tag{4.15}$$

Per $n = 2$, quindi, X_1, X_2 sono indipendenti se $P(X_1 = x_1, X_2 = x_2) = P(X_1 = x_1)P(X_2 = x_2)$ per ogni possibile valore x_1, x_2. Si noti che nella definizione di indipendenza per variabili aleatorie non è stata richiesta la fattorizzazione delle probabilità per sottofamiglie: mostreremo tra poco che questa proprietà è conseguenza della definizione data.

ESEMPIO 45. *Due estrazioni successive X_1 e X_2 dalla tombola sono indipendenti se effettuate con reinserimento e dipendenti se non c'è reinserimento; infatti, nel primo caso $P(X_1 = k, X_2 = m) = \frac{1}{90^2} = P(X_1 = k)P(X_2 = m)$ per ogni $k, m = 1, \ldots, 90$, mentre nel secondo caso $P(X_1 = 1, X_2 = 1) = 0 \neq \frac{1}{90^2} = P(X_1 = 1)P(X_2 = 1)$.*

LEMMA 8. *Se $X_1, \ldots, X_n$ sono variabili aleatorie indipendenti allora*
(I) per ogni $A_1, \ldots, A_n$, $A_i \subseteq S_{X_i}$ si ha

$$P(X_1 \in A_1, \ldots, X_n \in A_n) = \prod_{i=1}^{n} P(X_i \in A_i)$$

(II) per ogni $J \subseteq \{1, \ldots, n\}$ le variabili aleatorie X_i, $i \in J$, sono indipendenti,
(III) per ogni $A_1, \ldots, A_n$, $A_i \subseteq S_{X_i}$, gli eventi $(X_i \in A_i) = \{s \in S : X_i(s) \in A_i\}$ sono collettivamente indipendenti.

DIMOSTRAZIONE. Indichiamo con $\mathbf{x} = (x_1, \ldots, x_n)$ i vettori n dimensionali:

(I) Fissati $A_1, \ldots, A_n$ come nell'ipotesi si ha

$$P(X_1 \in A_1, \ldots, X_n \in A_n) = P(\cup_{x_1 \in A_1, \ldots, x_n \in A_n} \{\mathbf{X} = \mathbf{x}\}).$$

Gli eventi $\{\mathbf{X} = \mathbf{x}\}$ sono disgiunti per definizione di funzione, quindi per l'indipendenza degli X_i

$$\begin{aligned} P(X_1 \in A_1, \ldots, X_n \in A_n) &= \sum_{x_1 \in A_1, \ldots, x_n \in A_n} P(\mathbf{X} = \mathbf{x}) \\ &= \sum_{x_1 \in A_1, \ldots, x_n \in A_n} \prod_{i=1}^{n} P(X_i = x_i) \\ &= \prod_{i=1}^{n} \sum_{x_1 \in A_1, \ldots, x_n \in A_n} P(X_i = x_i) \\ &= \prod_{i=1}^{n} P(X_i \in A_i) \end{aligned}$$

(II) segue da (I) con

$$A_i = \begin{cases} x_i & \text{se } i \in J \\ S_{X_i} & \text{se } i \notin J \end{cases}$$

essendo

$$\begin{aligned} P(X_i = x_i \text{ se } i \in J) &= P(X_i = x_i \text{ se } i \in J \text{ e } X_j \in S_{X_j} \text{ se } j \notin J) \\ &= \prod_{i \in J} P(X_i = x_i) \prod_{j \notin J} P(X_j \in S_{X_j}) \\ &= \prod_{i \in J} P(X_i = x_i) \end{aligned}$$

(III) segue da (II) prendendo $X_i = \mathbb{I}_{A_i}$. □

Quindi la richiesta di fattorizzazione delle probabilità per tutti i valori del codominio delle variabili aleatorie include già la fattorizzazione delle stesse espressioni per sottinsiemi di funzioni.

Vediamo ora che funzioni di variabili aleatorie indipendenti sono ancora indipendenti, nel senso che

Teorema 8. *Date variabili aleatorie indipendenti $X_1, \ldots, X_n$ definite su uno spazio di probabilità (S, P) e due funzioni $\phi : C \to \mathbb{R}$ e $\psi : D \to \mathbb{R}$ tali che $S_{X_1} \times S_{X_2} \times \cdots \times S_{X_k} \subseteq C$ e $S_{X_{k+1}} \times \cdots \times S_{X_n} \subseteq D$ si ha che $T = \phi(X_1, \ldots, X_k)$ e $Z = \psi(X_{k+1}, \ldots, X_n)$ sono indipendenti.*

Dimostrazione. poiché gli eventi nell'unione che segue sono, come al solito, disgiunti, ed essendo le variabili aleatorie indipendenti si ha:

$$
\begin{aligned}
&P(T=t, Z=z)\\
&\quad = P(s : \phi(X_1(s),\dots,X_k(s)) = t,\\
&\qquad\qquad \psi(X_{k+1}(s),\dots,X_n(s)) = z)\\
&\quad = P\Big(\bigcup_{\substack{\boldsymbol{x}=(x_1,\dots,x_n):\phi(x_1,\dots,x_k)=t,\\ \psi(x_{k+1},\dots,x_n)=z}} \{s : (X_1(s),\dots,X_n(s)) = \boldsymbol{x}\}\\
&\quad = \sum_{\substack{\boldsymbol{x}=(x_1,\dots,x_n):\phi(x_1,\dots,x_k)=t,\\ \psi(x_{k+1},\dots,x_n)=z}} P((X_1,\dots,X_n) = \boldsymbol{x})\\
&\quad = \sum_{\substack{\boldsymbol{x}=(x_1,\dots,x_n):\phi(x_1,\dots,x_k)=t,\\ \psi(x_{k+1},\dots,x_n)=z}} \prod_{i=1}^{n} P(X_i = x_i)\\
&\quad = \sum_{\substack{(x_1,\dots,x_k):\\ \phi(x_1,\dots,x_k)=t}} \prod_{i=1}^{k} P(X_i = x_i) \sum_{\substack{(x_{k+1},\dots,x_n):\\ \psi(x_{k+1},\dots,x_n)=z}} \prod_{i=k+1}^{n} P(X_i = x_i)\\
&\quad = \sum_{\substack{\boldsymbol{x}=(x_1,\dots,x_k):\\ \phi(x_1,\dots,x_k)=t}} P((X_1,\dots,X_k) = \boldsymbol{x})\\
&\qquad\qquad \times \sum_{\substack{\boldsymbol{x'}=(x_{k+1},\dots,x_n):\\ \psi(x_{k+1},\dots,x_n)=z}} P((X_{k+1},\dots,X_n) = \boldsymbol{x'})\\
&\quad = P(T=t)P(Z=z).
\end{aligned}
$$

□

Questo risultato ha molte conseguenze interessanti, ad esempio la seguente:

Esempio 46. *Giocando $k+1$ partite alla roulette, se X_i è il numero che esce nell'i-sima partita si ha che le variabili $X_1,\dots,X_k,X_{k+1}$ sono indipendenti. Ogni strategia che, a k fissato, cerchi di determinare su quale numero scommettere alla $k+1$-sima partita osservando i risultati delle partite precedenti è equivalente ad una funzione $\phi(X_1,\dots,X_k)$ e, per il teorema appena provato, X_{k+1} ne risulta quindi indipendente. Per cui il teorema porta a concludere che non esiste nessuna strategia che dalle prime k partite dia suggerimenti sulla successiva partita.*

Si può ovviamente pensare una strategia che non fissi k a priori (tipo aspettare la prima uscita del 3), ma ne rimandiamo l'analisi in quanto richiede un modello con una infinità di possibili risultati, che tratteremo più avanti.

Una delle proprietà fondamentali delle variabili aleatorie indipendenti si riferisce al valore atteso del prodotto di variabili aleatorie.

TEOREMA 9. *Se X_i, $i = 1, \ldots, n$ sono variabili aleatorie indipendenti su (S, P) allora*

$$E(\prod_{i=1}^{n} X_i) = \prod_{i=1}^{n} E(X_i).$$

DIMOSTRAZIONE. Cominciamo da $n = 2$:

$$\begin{aligned}
E(X_1X_2) &= \sum_{t \in S_{X_1X_2}} tP(X_1X_2 = t) \\
&= \sum_{t \in S_{X_1X_2}} \sum_{x_1 \in S_{X_1}, x_2 \in X_2} x_1x_2P(X_1 = x_1, X_2 = x_2) \\
&= \sum_{x_1 \in S_{X_1}} x_1P(X_1 = x_1) \sum_{t \in S_{X_1X_2}} \sum_{x_2 \in S_{X_2}: x_1x_2 = t} x_2P(X_2 = x_2) \\
&= \sum_{x_1 \in S_{X_1}} x_1P(X_1 = x_1) \sum_{x_2 \in S_{X_2}} x_2P(X_2 = x_2) \\
&= E(X_1)E(X_2)
\end{aligned}$$

poiché la seconda uguaglianza discende dall'additività della probabilità dell'unione disgiunta di insiemi.

Il risultato per n generico discende per induzione su n essendo $\prod_{i=1}^{n-1} X_i$ indipendente da X_n. □

ESERCIZIO 12. *Due variabili aleatorie dipendenti tali che $E(X_1X_2) = E(X_1)E(X_2)$ si possono ottenere assegnando le probablità seguenti. Siano X_1, X_2 a valori in $\{0, 1\}$ e siano $P(X_1 = 0, Y_1 = 0) = \frac{2}{12}$, $P(X_1 =, Y_1 = 0) = \frac{6}{12}$, $P(X_1 = 0, Y_1 = 1) = \frac{1}{12}$ e di conseguenza $P(X_1 = 1, Y_1 = 1) = \frac{3}{12}$. Verificare quanto affermato.*

DEFINIZIONE 11. *Variabili aleatorie $X_1, \ldots, X_n$ su uno spazio di probabilità che siano indipendenti e tali che $X_i =^d X_j$ per ogni $i, j = 1, \ldots, n$ si dicono* **indipendenti ed identicamente distribuite** *o* **i.i.d.**.

4.4. Deviazioni dalla media

Il valore atteso $E(X)$ di una variabile aleatoria X dà un'idea di quanto ci possiamo aspettare, ma abbiamo già visto che non è esattamente il valore $E(X)$ che ci possiamo attendere come risultato di una realizzazione di X. Il teorema di De Moivre-Laplace fornisce una stima molto precisa di quanto i valori che si realizzano più spesso differiscono dal valore atteso di una distribuzione di Bernoulli, ma per il caso generale discutiamo ora una prima stima. Ricordiamo inoltre che non abbiamo ancora chiarito il significato del termine $\sqrt{p(1-p)}$.

Lo scarto massimo $\max(X-E(X))$ tende a sopravvalutare lo scarto tipico di una realizzazione e chiaramente lo scarto medio $E(X-E(X))$ non ha significato, essendo identicamente nullo per la linearità del valore atteso. Lo scarto assoluto medio $E(|X-E(X)|)$ è una soluzione migliore.

Esempio 47. *Per $X \sim B(1,p)$ si ha $E(X)=p$ e lo scarto assoluto medio risulta essere $2p(1-p)$; per il risultato del lancio di un dado Y lo scarto assoluto medio è $1,5$.*

Si osservi però che il calcolo dello scarto assoluto medio per variabili con distribuzione $B(n,p)$ risulta laborioso e che comunque non risulta spiegato il termine $\sqrt{p(1-p)}$. Pensandoci, non c'è una ragione evidente per non considerare lo scarto quadratico medio di X

$$SD(X) = \sqrt{E(X-E(X))^2}$$

detta anche **deviazione standard** di X. O anche qualche altra potenza. Tuttavia risulta che

Esempio 48. *Per $X \sim B(1,p)$ lo scarto quadratico medio risulta essere $\sqrt{p(1-p)}$ e per il risultato del lancio di un dado lo scarto quadratico medio è circa $1,70$.*

Si vede da questi esempi che lo scarto quadratico medio non differisce sostanzialmente dallo scarto assoluto medio, ma soprattutto 'spiega' il termine che appare nel teorema di De Moivre-Laplace. L'espressione $Var(X) = E(X-E(X))^2$ è detta **varianza** di X. La varianza può essere anche calcolata come segue.

Lemma 9. *Per ogni variabile aleatoria X si ha*

$$Var(X) = E(X^2) - (E(X))^2.$$

Dimostrazione.

$$\begin{aligned} Var(X) &= E(X-E(X))^2 \\ &= E(X^2 - 2XE(X) + (E(X))^2) \\ &= E(X^2) - (E(X))^2 \end{aligned} \tag{4.16}$$

□

Un importante risultato relativo alla varianza è che risulta additiva per somme di variabili aleatorie indipendenti.

TEOREMA 10. *Per ogni $X_1, \dots X_n$ variabili aleatorie indipendenti su uno spazio di probabilità (S, P) si ha*

$$Var(\sum_{i=1}^{n} X_i) = \sum_{i=1}^{n} Var(X_i)$$

e

$$SD(\sum_{i=1}^{n} X_i) = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} Var(X_i)}.$$

DIMOSTRAZIONE. Iniziamo da $n = 2$.

$$\begin{aligned} Var(X_1 + X_2) &= E(X_1 + X_2)^2 - (E(X_1 + X_2))^2 \\ &= E(X_1)^2 + E(X_2)^2 + 2E(X_1X_2) \\ &\qquad -(E(X_1))^2 - (E(X_2))^2 - 2E(X_1)E(X_2) \\ &= Var(X_1) + Var(X_2) + 2(E(X_1X_2) - E(X_1)E(X_2)) \\ &= Var(X_1) + Var(X_2) \end{aligned}$$

poiché per variabili indipendenti $E(X_1X_2) = E(X_1)E(X_2)$ dal Teorema 9.

Il risultato per n generico si ottiene per induzione essendo $\sum_{i=1}^{n-1} X_i$ indipendente da X_n.

Il risultato per la deviazione standard segue dalla definizione. □

Quindi per variabili i.i.d. $X_1, \dots, X_n$ si ha che $SD(\sum_{i=1}^{n} X_i) = nSD(X_1)$. In particolare se $X_i \sim B(1, p)$ allora $SD(\sum_{i=1}^{n} X_i) = \sqrt{np(1-p)}$.

Quindi la deviazione standard è contemporaneamente facile da calcolare per somme di variabili indipendenti ed assegna un significato all'espressione $\sqrt{np(1-p)}$ che appare nel teorema di De Moivre-Laplace. Questo ci permette di congetturare un'estensione di questo risultato a tutte le variabili aleatorie finite. Rileggendo infatti il risultato per

$T_n \sim B(n,p)$ ossia tale che $T_n = \sum_{i=1}^n X_i$, $X_i \sim B(1,p)$, si ha

$$\begin{aligned}
\sum_{j \geq np + a\sqrt{np(1-p)}} \mathcal{P}(j,n,p) &= \sum_{j \geq np + a\sqrt{np(1-p)}} P(\sum_{i=1}^n X_i = j) \\
&= P\left(\sum_{i=1}^n X_i \geq np + a\sqrt{np(1-p)}\right) \\
&= P\left(\sum_{i=1}^n X_i \geq nE(X_1) + a\sqrt{nVar(X_1)}\right) \\
&= P\left(\frac{\sum_{i=1}^n X_i - nE(X_1)}{\sqrt{nVar(X_1)}} \geq a\right) \\
&= P\left(\frac{(\sum_{i=1}^n X_i) - E(\sum_{i=1}^n X_i)}{\sqrt{Var(\sum_{i=1}^n X_i)}} \geq a\right).
\end{aligned}$$

L'espressione $\frac{(\sum_{i=1}^n X_i) - E(\sum_{i=1}^n X_i)}{\sqrt{Var(\sum_{i=1}^n X_i)}}$ può essere interpretata in un modo diretto: $\sum_{i=1}^n X_i$ è una variabile aleatoria che dà i possibili valori della media empirica, a questa viene sottratto il suo valore atteso dividendo poi per la sua deviazione standard.

Definizione 12. *Data una variabile aleatoria X, si dice* **variabile standardizzata** *o* **versione standardizzata di** X *l'espressione*

$$\frac{X - E(X)}{SD(X)}$$

.

Il Teorema di De Moivre-Laplace ci dice quindi che la versione standardizzata della somma di variabili aleatorie indipendenti (binomiali) ha probabilità descritte asintoticamente dalla gaussiana. La versione standardizzata della somma è ben definita per ogni variabile aleatoria finita, quindi è ragionevole congetturare che

Teorema 11 (Teorema Centrale del Limite). *Per variabili aleatorie i.i.d. $X_1, \ldots, X_n$ su uno spazio di probabilità finito vale per ogni $a \in \mathbb{R}$*

$$\lim_{n\to\infty} P\left(\frac{\sum_{i=1}^n X_i - nE(X_1)}{\sqrt{nVar(X_1)}} \geq a\right) = \int_a^\infty \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2} dx$$

Per ora non dimostreremo questo teorema poiché ne vale in realtà una versione ancora più generale.

Ci si potrebbe porre il problema di stimare la deviazione della deviazione dal valor medio dalla sua media, per esempio con $E(|X - E(X) -$

$\sqrt{E(X-E(X))^2}|)$ oppure $E(\sqrt{(X-E(X)-\sqrt{E(X-E(X))^2})^2})$. Tuttavia questo non viene generalmente sviluppato perché (1), come illustrato dal Teorema centrale del limite, spesso è il secondo momento, e quindi la deviazione standard, che descrive in dettaglio la distribuzione della deviazione dalla media, (2) non introduce nessuna novità teorica perché si tratta sempre di un valore atteso di una deviazione e (3) diventa più chiaro porsi direttamente il problema della ricostruzione di una variabile aleatoria dalla conoscenza dei suoi momenti, un problema che non trattiamo in queste note.

4.5. Diseguaglianze e legge debole dei grandi numeri

La varianza dà un'idea della deviazione tipica dalla media, ma ora vediamo qualche risultato che dia una stima di questa deviazione.

Lemma 10 (Diseguaglianza di Markov). *Per ogni variabile aleatoria $X \geq 0$ non negativa e per ogni $a > 0$ si ha*

$$P(X \geq a) \leq \frac{E(X)}{a}$$

.

Dimostrazione. Essendo $X \geq 0$, per ogni $a > 0$ si ha:

$$\begin{aligned} E(X) &= \sum_{x \in S_X} x P_X(x) \\ &\geq \sum_{x \in S_X, x \geq a} x P_X(x) \geq a P(X \geq a) \end{aligned}$$

□

Da questo segue

Corollario 2 (Diseguaglianza di Chebyshev). *Per ogni variabile aleatoria X finita e per ogni $a > 0$ si ha:*

$$P(|X - E(X)| \geq a) \leq \frac{Var(X)}{a^2},$$

ossia

$$P(\left|\frac{X - E(X)}{SD(X)}\right| \geq a) \leq \frac{1}{a^2}.$$

Dimostrazione. Essendo $(|X - E(X)|)^2 = (X - E(X))^2 \geq 0$, dal Lemma 10 segue che per ogni $a > 0$ si ha:

$$P(|X - E(X)| \geq a) = P((X - E(X))^2 \geq a^2) \leq \frac{Var(X)}{a^2}$$

□

Queste diseguaglianze non sono troppo accurate, come si vede dall'esempio seguente, anzi talvolta sono banali in quanto il maggiorante è maggiore di 1.

Esempio 49. *Se X è il risultato del lancio di un dado allora*

$$\frac{1}{3} = P(X \geq 5) \leq \frac{1}{5}3,5 = 0,7$$

dal Lemma 10 e

$$\frac{1}{3} = P(|X - 3,5| \geq 2,5) \leq \frac{1}{(2,5)^2}Var(X) \approx 0.47$$

dal Corollario 2.

Si possono tuttavia dedurre due cose.

Lemma 11. *Se $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2} dx = 1$ allora la costante nell'approssimazione di Stirling soddisfa $e^c = \sqrt{2\pi}$.*

Dimostrazione. Dalla parte dimostrata della legge di De Moivre-Laplace scritta in termini di variabili aleatorie sappiamo che per ogni $a_1, a_2 \geq 0$

$$Q_n(a_1, a_2) = P(\frac{\sum_{i=1}^n X_i - np}{\sqrt{np(1-p)}} \in [a_1, a_2]) \to_{n\to\infty} \int_{a_1}^{a_2} \frac{1}{e^c} e^{-x^2/2} dx$$

e per la simmetria della distribuzione di Bernoulli e della gaussiana, questo risultato vale anche quando $a_1, a_2 \leq 0$ e dall'additività per ogni $a_1, a_2 \in \mathbb{R}$. A noi interessa qui per $a_1 = -a = -a_2 < 0$.
1. Assumendo $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2} dx = 1$ si ha che per ogni $a > 0$ vale $1 \geq Q_n(-a, a)$ per ogni n; pertanto anche

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2} dx = 1 &\geq \lim_{n\to\infty} Q_n(-a, a) \\ &= \int_{-a}^{a} \frac{1}{e^c} e^{-x^2/2} dx \end{aligned} \tag{4.17}$$

per ogni $a > 0$. Questo implica $e^c \geq \sqrt{2\pi}$.
2. D'altra parte, dalla definizione di limite, per ogni $\epsilon > 0$ esiste $N > 0$ tale che per ogni $n \geq N$ vale la prima diseguaglianza in

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2} dx &= 1 = P(\sum_{i=1}^n X_i \in [0, n]) \\ &= P(\frac{\sum_{i=1}^n X_i - np}{\sqrt{np(1-p)}} \in [-a, a]) \\ &\qquad -P(|\frac{\sum_{i=1}^n X_i - np}{\sqrt{np(1-p)}}| \geq a) \\ &\leq \int_{-a}^{a} \frac{1}{e^c} e^{-x^2/2} dx + \epsilon + P(|\frac{\sum_{i=1}^n X_i - np}{\sqrt{np(1-p)}}| \geq a) \\ &\leq \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{e^c} e^{-x^2/2} dx + \epsilon + \frac{1}{a^2}, \end{aligned}$$

in cui l'ultima diseguaglianza segue dalla diseguaglianza di Chebyshev. Quindi se $a > \epsilon^{-1/2}$ si ha

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2} dx \leq \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{e^c} e^{-x^2/2} dx + 2\epsilon$$

da cui $e^c \leq \sqrt{2\pi}$. □

La seconda conseguenza riguarda la probabilità di una deviazione dal valore atteso dell'ordine di n:

Teorema 12 (Legge (debole) dei grandi numeri). *Per variabili aleatorie finite i.i.d. $X_1, X_2, \ldots$ su si ha che per ogni $\alpha > 0$*

$$\lim_{n\to\infty} P(\left|\sum_{i=1}^{n} X_i - E(X_1)\right| > \alpha) = 0$$

nel senso che fissata una distribuzione finita (S_X, P_X) per ogni $\epsilon > 0$ esiste N tale che per ogni $n \geq N$ se si prendono n variabili aleatorie indipendenti ognuna con distribuzione (S_X, P_X) allora $P(\left|\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i - E(X_1)\right| > \alpha) < \epsilon$.

L'esistenza di variabili indipendenti con una distribuzione data verrà verificata più avanti.

Dimostrazione. Dalla diseguaglianza di Chebyshev si ha:

$$\begin{aligned} P(\left|\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i - E(X_1)\right| > \alpha) &= P(\left|\sum_{i=1}^{n} X_i - nE(X_1)\right| > n\alpha) \\ &\leq \frac{1}{n^2\alpha^2} Var(\sum_{i=1}^{n} X_i) \\ &= \frac{nVar(X_1)}{n^2\alpha^2} \to_{n\to\infty} 0 \end{aligned}$$

□

Esempio 50. *Se X_i sono i risultati di lanci indipendenti di un dado allora*

$$P(\left|\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i - E(X_1)\right| > 10^{-10}) \to_{n\to\infty} 0$$

anzi

$$P(\left|\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i - E(X_1)\right| > 10^{-10}) \leq \frac{2,9 \times 10^{20}}{n}.$$

Si noti che quest'ultima stima ha senso solo per $n \geq 2,9 \times 10^{20}$; tuttavia ha poco senso dare troppa importanza al valore quantitativo di queste stime a causa della loro scarsa accuratezza.

4.6. Approssimazione di Poisson

Vediamo ora un'approssimazione per la distribuzione binomiale quando la probabilità di successo p ed il numero di prove n sono tali che pn è dell'ordine di 1:

Esempio 51. *Sorteggiando con reinserimento dalla tombola* 180 *volte la probabilità che l'*1 *esca esattamente* 2 *volte è :*

$$\mathcal{P}(2, 180, \frac{1}{90}) = \binom{180}{2} \frac{1}{90^2} (\frac{89}{90})^{178}.$$

Teorema 13 (Approssimazione di Poisson). *Se* $p = p_n$ *è tale che* $\lim_{n\to\infty} np_n = \lambda > 0$ *si ha*

$$\lim_{n\to\infty} \mathcal{P}(k, n, p_n) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}.$$

Dimostrazione. poiché $\lim_{n\to\infty}(1 - p_n)^n = e^{-\lambda}$ si ha

$$\begin{aligned} \mathcal{P}(k, n, p_n) &= \binom{n}{k} (p_n)^k (1 - p_n)^{n-k} \\ &= \frac{n(n-1)\dots(n-k+1)}{k!} (p_n^k)(1 - p_n)^n (1 - p_n)^{-k} \\ &\to_{n\to\infty} \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} \end{aligned}$$

□

CAPITOLO 5

PROBABILITÀ SU INSIEMI DISCRETI

5.1. Spazi di probabilità su insiemi discreti

Contemporaneamente allo sviluppo delle probabilità finite alcuni studiosi si resero conto che taluni problemi non si potevano formalizzare con un numero finito di possibilità. I primi problemi di questo tipo appaiono in un libro di Huygens del 1657.

Esempio 52. *Se giocando a dadi A vince se esce prima il 6 di 1 e 2, e viceversa per B, qual è la probabilità che A vinca? Chiaramente è naturale considerare la probabilità che vinca A al lancio k, per $k \in \mathbb{N}$.*

Ciò motiva l'introduzione di spazi di probabilità con S numerabile; ma questo introduce una nuova scelta: se $\{A_i\}_{i\in\mathbb{N}}$ è una famiglia numerabile di eventi disgiunti, si dovrà richiedere la numerabile additività della probabilità o solo quella finita? La questione non è risolta in modo univoco: una condizione più stringente limita il campo di applicazione della teoria ma ne semplifica gli sviluppi ed è quindi ragionevole richiederla quando il campo di applicazione resti comunque sufficientemente ampio. In generale, l'imposizione dell'additività numerabile non pone restrizioni di rilievo alla applicazioni fisiche (trattandosi perlopiù di esperimenti ripetibili a piacere) mentre ne pone in ambiti economici, trattandosi spesso in quel caso di situazioni solo occasionalmente ripetibili. Noi qui lo adotteremo sia per semplicità sia perché comunque la teoria qui esposta ha una sufficiente ampiezza di applicazioni anche in campo socio-economico-finanziario.

Definizione 13. *Uno* **spazio di probabilità discreto** *è una coppia (S, P) in cui S è un insieme al più numerabile e P è una funzione definita sulle parti di S tale che:*
(1) $P(S) = 1$
(2) per ogni $A \subseteq S$, $P(A) \in [0, 1]$;
(3) se A_i, $i = 1, 2, \ldots$, $A_i \subseteq S$ sono insiemi disgiunti allora

$$P(\cup_{i=1}^{\infty} A_i) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$$

in cui si intende che a destra c'è una serie a termini positivi convergente.

La richiesta di additività numerabile rende in realtà il modello più semplice di quanto l'assiomatica appena descritta sembrasse prospettare.

LEMMA 12. *Tutti e soli gli spazi di probabilità discreti sono ottenuti da un insieme al più numerabile S e da una funzione $q : S \to \mathbb{R}^+$ tale che $\sum_{s\in S} q(s) < \infty$ ponendo per ogni $A \subseteq S$*

$$P(A) = \frac{\sum_{s\in A} q(s)}{\sum_{s\in S} q(s)}.$$

DIMOSTRAZIONE. Ogni spazio di probabilità discreto (S, P) si può rappresentare come detto con $q(s) = P(s)$. Viceversa, dato q come nell'asserzione basta porre $P(s) = \frac{q(s)}{\sum_{s\in S} q(s)}$; la verifica che P è una probabilità è lasciata per esercizio. □

OSSERVAZIONE 8. *Per gli spazi di probabilità discreti vale l'additività finita della probabilità e quindi valgono tutti i risultati dei capitoli 2 e 3 nella forma in cui sono enunciati, ossia riferiti ad un numero finito di eventi. E' solo quando è coinvolta una famiglia numerabile di eventi che dobbiamo dedurre i risultati dall'additività numerabile (e dalle proprietà delle serie).*

ESEMPIO 53. *Nell'esempio 52 se A è l'evento che vince A; A_i è l'evento che vince A alla i-sima prova; N_j è l'evento che alla j-sima prova non escono nessuno di $\{1, 2, 6\}$ e S_j è l'evento che esce il 6 alla j-sima prova per l'indipendenza della prove si ha*

$$P(A_i) = P(\cap_{j=1}^{i-1} N_j \cap S_i) = (\frac{1}{2})^{i-1}\frac{1}{6}$$

e quindi

$$\begin{aligned} P(A) &= P(\cup_{i=1}^{\infty} A_i) \\ &= \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i) \\ &= \sum_{i=1}^{\infty} (\frac{1}{2})^{i-1}\frac{1}{6} = \frac{1}{3}. \end{aligned}$$

La probabilità che il primo successo di prove indipendenti ognuna con probabilità di successo p avvenga alla n-sima prova si può calcolare considerando, come nell'esempio, l'evento A_i che il primo successo sia alla i-sima prova e l'evento B_j che indica successo alla j-sima prova; per l'indipendenza della prove si ha

$$P(A_i) = P(\cap_{j=1}^{i-1} B_j^c \cap B_i) = (1-p)^{i-1}p.$$

Ora questo suggerisce di definire uno spazio di probabilità discrete $(\overline{S}, \overline{P})$ con $\overline{S} = \mathbb{N}$ e $\overline{P}$ data da

$$\overline{P}(i) = (1-p)^{i-1}p.$$

Infatti correttamente si ha;

$$\sum_{i=1}^{\infty} \overline{P}(i) = \sum_{i=1}^{\infty} (1-p)^{i-1} p = 1$$

.

Definizione 14. *Lo spazio di probabilità* $(\overline{S}, \overline{P})$ *relativo al primo successo in prove indipendenti ognuna con probabilità di successo* p *è detto* **distribuzione geometrica** *di parametro* p.

Si noti che anche l'approssimazione di Poisson generava una funzione di k per $k \in \mathbb{N}$; inoltre poiché

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} = 1$$

si possono prendere questi valori come probabilità:

Definizione 15. *Per ogni* $\lambda \in \mathbb{R}$, *uno spazio di probabilità* $(\overline{S}, \overline{P})$ *con* $\overline{S} = \mathbb{N}$ *e* $\overline{P}$ *data da*

$$\overline{P}(k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$$

è detto **distribuzione di Poisson** *di parametro* λ.

5.2. Variabili aleatorie discrete

Passiamo ora allo studio delle variabili aleatorie definite su uno spazio di probabilità discreto. Non c'è nessuna difficoltà a porre

Definizione 16. *Dato uno spazio di probabilità* (S, P), *una variabile aleatoria discreta* X *è una funzione* $X : S \to \mathbb{R}$.

Anche per una variabile aleatoria discreta X è possibile definire la distribuzione (S_X, P_X) come in (4.12).

Esercizio 13. *Verificare che* (S_X, P_X) *è uno spazio di probabilità discreto.*

Si può poi ripetere la Definizione 6 di uguaglianza in distribuzione.

Esempio 54. *Se* (S, P), $S = \mathbb{N}$ *è uno spazio di probabilità che descrive la distribuzione del primo successo in prove indipendenti con probabilità di successo* p, *la variabile aleatoria* Y = *tempo del primo successo è definita da* $X(k) = k$ *ha distribuzione* $P(X = j) = (1-p)^{j-1}p$ *é detta variabile geometrica*(p), *mentre la variabile aleatoria* Y = *tempo di attesa del primo successo è definita da* $Y(k) = k - 1$ *ha distribuzione* $P(Y = j) = (1-p)^j p$.

Si noti che $Y =^d X - 1$.

Esempio 55. *Se* (S_λ, P_λ) *è uno spazio di probabilità di Poisson e una variabile aleatoria* N *ha distribuzione* (S_λ, P_λ) *allora si dice che* N *ha distribuzione di Poisson*(λ).

C'è invece qualche problema nel definire il valore atteso:

Esempio 56. *In un gioco, se la prima uscita del* 6 *in un dado è alla k-sima prova si vince (o si perde se negativo) l'importo* x_k. *Giochereste se*

(a) $x_k = (-1)^k k$*?*

(b) $x_k = (-1)^k (6/5)^k$*?*

Si consideri uno spazio di probabilità geometrico(p) e la variabile aleatoria $X(k) = (x_k)$. *Per valutare il nostro vantaggio nel gioco verrebbe di calcolare* $E(X)$, *ma una ragionevole espressione sarebbe* $\sum_{k=1}^{\infty} x_k (5/6)^k$ *che nel caso (a) dà* $11/375 - 6/11 < 0$, *ma nel caso (b) dà* $1/5 \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k$ *che è una serie indeterminata.*

Per non rischiare di incontrare situazioni come questa e per garantire che le principali proprietà del valore atteso siano conservate si pone:

Definizione 17. *Dato uno spazio di probabilità* (S, P), *ed una variabile aleatoria discreta* X *si dice valore atteso, o speranza matematica, di* X *il valore*

$$E(X) = \sum_{s \in S} X(s) P(s)$$

se

$$E(|X|) = \sum_{s \in S} |X(s)| P(s) < \infty;$$

in altre parole si richiede la convergenza assoluta della serie che definisce il valore atteso.

Esempio 57. *Per il caso (b) dell'esempio precedente il valore atteso non esiste e si dovranno sviluppare altri metodi.*

Esempio 58. *Se* $X \sim$ *geometrica(p) allora* $X \geq 0$ *e quindi basta che sia finita* $E(X)$ *stessa: derivando per serie, come lecito all'interno del raggio di convergenza di una serie di potenze, si ha:*

$$\begin{aligned} E(X) &= \sum_{k=0}^{\infty} kp(1-p)^{k-1} \qquad (5.18) \\ &= -\sum_{k=1}^{\infty} p \frac{d}{dp} (1-p)^k \\ &= -\frac{d}{dp} \sum_{k=1}^{\infty} p(1-p)^k \\ &= -p \frac{d}{dp} \frac{1}{p} = \frac{1}{p}. \end{aligned}$$

Intuitivamente, se la probabilità di successo è $p = \frac{1}{m}$, allora il primo successo arriverà in media alla m-sima prova.

Esempio 59. *Se $X \sim$ Poisson(λ) allora $X \geq 0$ e*

$$\begin{aligned} E(X) &= \sum_{k=0}^{\infty} k \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} \\ &= \lambda \sum_{k=1}^{\infty} k \frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!} e^{-\lambda} = \lambda. \end{aligned} \tag{5.19}$$

Avendo quindi assunto la convergenza assoluta della serie che definisce il valore atteso, valgono tutti i risultati relativi alle proprietà del valore atteso. In particolare valgono i Lemmi 6 e 7. Il lettore è invitato a verificare che le dimostrazioni dei Lemmi suddetti possono essere adattate anche al caso presente.

Come esempio mostriamo come si adatta la dimostrazione della parte (ii) del Lemma 7 nel caso $a_1 = a_2 = 1, X_1 = X, X_2 = Y$. Assumendo che $E(X)$ ed $E(Y)$ esistano, prima si dimostra che $E(X+Y)$ esiste e poi se ne calcola il valore. Per la diseguaglianza triangolare, poichè $X \leq Y$ implica $E(X) \leq E(Y)$ e poiché si può cambiare a piacere l'ordine di sommazione di una serie a termini positivi convergente, si ha:

$$\begin{aligned} E(|X+Y|) &\leq E(|X| + |Y|) \\ &= \sum_{s \in S} (|X(s)| + |Y(s)|) P(s) \\ &= \sum_{s \in S} (|X(s)| P(s) + \sum_{s \in S} (|Y(s)| P(s) \\ &= E(|X|) + E(|Y|) < \infty \end{aligned} \tag{5.20}$$

dall'ipotesi; la finitezza del risultato giustifica a posteriori la riorganizzazione delle somme. Ora

$$\begin{aligned} E(X+Y) &= \sum_{s \in S} (X(s) + Y(s)) P(s) \\ &= \sum_{s \in S} (X(s) P(s) + \sum_{s \in S} (Y(s) P(s) \\ &= E(X) + E(Y) < \infty \end{aligned} \tag{5.21}$$

in cui abbiamo riorganizzato nuovamente l'ordine di sommazione in quanto le serie coinvolte sono assolutamente convergenti.

Esercizio 14. *Verificare che le altre dimostrazioni citate si estendono al caso delle variabili discrete.*

Aggiungiamo un'altra semplice conseguenza della diseguaglianza triangolare:

Esercizio 15. *Mostrare che $|E(X)| \leq E(|X|)$.*

Considerando le difficoltà relative ai prodotti infiniti la definizione di indipendenza di una famiglia di variabili aleatorie discrete può essere data riferendosi a sottofamiglie finite:

DEFINIZIONE 18. *Le variabili di una famiglia al più numerabile di variabili aleatorie* $X_1, \dots X_n, \dots$ *si dicono indipendenti se sono indipendenti le variabili aleatorie in ogni sottofamiglia finita.*

ESERCIZIO 16. *Verificare che valgono il Lemma 8 ed il teorema 8 nel caso delle variabili discrete.*

Anche per le variabili aleatorie discrete il valore atteso del prodotto di variabili indipendenti è uguale al prodotto dei valori attesi, questa volta però occorre introdurre una condizione sufficiente affinché il valore atteso del prodotto esista. Per questo bisogna conviene premettere la discussione sul valore atteso di funzioni delle variabili aleatorie.

Infatti, se ϕ è una funzione definita su S_X allora $\phi(X)$ è una variabile aleatoria discreta, ma non è detto che anche se X ha valore atteso ci sia il valore atteso di $\phi(X)$.

ESERCIZIO 17. *Mostrare che esistono una variabile aleatoria* X *ed una funzione* ϕ *definita su* S_X *tali che* $E(X)$ *esiste ma* $E(\phi(X))$ *non esiste.*

Tuttavia, se il valore atteso di $\phi(X)$ esiste, allora si può calcolare con il cambiamento di variabili:

ESERCIZIO 18. *Verificare che se* X *è una variabile aleatoria discreta e* ϕ *è una funzione definita su* S_X *e se* $E(\phi(X))$ *ammette valore atteso, allora vale il Teorema 7.*

Ora torniamo alla questione del valore atteso di variabili aleatorie indipendenti. Analogamente a prima, dalla sola esistenza del valore atteso di X ed Y non si può dedurre l'esistenza del valore atteso di XY o viceversa.

ESERCIZIO 19. *Mostrare che esistono variabili aleatorie* X *ed* Y *tali che* $E(X)$ *ed* $E(Y)$ *esistono ma non esiste* $E(XY)$. *Viceversa, mostrare che esistono variabili aleatorie* X *ed* Y *tali che* $E(XY)$ *esiste ma* $E(X)$ *non esiste.*

Occorre quindi condizioni per garantire l'esistenza di altri valori attesi. Un primo risultato dice che i momenti successivi implicano l'esistenza dei momenti precedenti.

LEMMA 13. *Se* X *è una variabile aleatoria discreta tale che* $E(X^k)$ *esiste, con questo intendendo che* $X \geq 0$ *oppure* $k \in \mathbb{N}$, *per qualche* k, *allora esiste* $E(X^h)$ *per ogni* $h \leq k$, *sempre intendendo* $X \geq 0$ *oppure* h *intero.*

Dimostrazione.

$$\begin{aligned}
E(|X^h|) &= \sum_{s\in S} |X(s)^h| P(s) \\
&= \sum_{s\in S:|X(s)^h|\le 1} |X(s)^h| P(s) + \sum_{s\in S:|X(s)^h|>1} |X(s)^h| P(s) \\
&\le P(|X^h| \le 1) + \sum_{s\in S:|X(s)^h|>1} |X(s)^k| P(s) \\
&\le P(|X^h| \le 1) + \sum_{s\in S} |X(s)^k| P(s) < \infty
\end{aligned}$$

□

Lemma 14. *Se X ed Y sono variabili aleatorie discrete tali che $E(X^2)$ ed $E(Y^2)$ esistono, allora esistono $E(X)$, $E(Y)$ ed $E(XY)$.*

Dimostrazione. L'esistenza di $E(X)$ ed $E(Y)$ segue dal lemma precedente. Da $0 \le (a-b)^2 = a^2 + b^2 - 2ab$ si ha che per qualsiasi coppia di numeri reali a e b vale che $ab \le (a^2+b^2)/2$, per cui

$$\begin{aligned}
E(|XY|) &= \sum_{s\in S} |X(s)||Y(s)| P(s) \\
&= \frac{1}{2} \sum_{s\in S} (|X(s)|^2 + |Y(s)|^2) P(s) \\
&\le \frac{1}{2} (\sum_{s\in S} |X(s)|^2 P(s) + \sum_{s\in S} |Y(s)|^2 P(s)) < \infty
\end{aligned}$$

□

Ora abbiamo condizioni sufficienti per generalizzare i risultati sui valori attesi di variabili indipendenti.

Esercizio 20. *Verificare che se X_i sono variabili aleatorie discrete tali che $E(X_i^2)$ esiste per ogni i allora vale il Teorema 9.*

Con il secondo momento è quindi possibile definire la varianza e la deviazione standard di X e vale anche in questo caso l'additività delle varianze per variabili indipendenti.

Esercizio 21. *Verificare che se X è una variabile aleatoria discreta tale che $E(X^2)$ esiste allora la varianza e la deviazione standard di X esistono e vale il Teorema 10.*

5.3. Vettori aleatori e variabili aleatorie congiunte

In molti problemi, come quando abbiamo parlato di indipendenza di variabili aleatorie o linearità del valore atteso, si considerano più variabili aleatorie contemporaneamente. In questo caso conviene pensarle come un vettore aleatorio.

DEFINIZIONE 19. *Dato uno spazio di probabilità (discreta)* (S, P), *un* **vettore aleatorio** $\boldsymbol{X} = (X_1, \ldots, X_n)$ *n-dimensionale è una funzione* $\boldsymbol{X}\colon S \to \mathbb{R}^n$ *tale che* $s \to \boldsymbol{X}(s) = ((X_1(s), \ldots, X_n(s))$.

Si possono ripetere ora molte definizioni e proprietà delle variabili aleatorie, che si ottengono semplicemente sostituendo $\boldsymbol{X}$ ad X.

DEFINIZIONE 20. *La distribuzione di un vettore aleatorio* $\boldsymbol{X} = (X_1, \ldots, X_n)$, *detta anche* **distribuzione congiunta** *delle* X_i, *è la coppia* $(S_{\boldsymbol{X}}, P_{\boldsymbol{X}})$ *con*

$$S_{\boldsymbol{X}} = \{\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n |\ \textit{esiste } s \in S : \boldsymbol{X}(s) = \boldsymbol{x}\}$$

e

$$P_{\boldsymbol{X}}(\boldsymbol{x}) = P\{s \in S : \boldsymbol{X}(s) = \boldsymbol{x}\}$$

Si noti che per l'usuale proprietà delle funzioni, per ogni $B \subseteq S_{\boldsymbol{X}}$

$$P_{\boldsymbol{X}}(B) = \sum_{\boldsymbol{x} \in B} P_{\boldsymbol{X}}(\boldsymbol{x}).$$

ESERCIZIO 22. *Se* $\boldsymbol{X}$ *è un vettore aleatorio discreto, verificare che* $(S_{\boldsymbol{X}}, P_{\boldsymbol{X}})$ *è uno spazio di probabilità discreto.*

In un vettore aleatorio $\boldsymbol{X} = (X_1, \ldots, X_n)$ ciascuna delle componenti X_i è una variabile aleatoria, con una sua distribuzione (S_{X_i}, P_{X_i}), ed è interessante ed utile in vari problemi studiare la relazione tra queste e la distribuzione congiunta $(S_{\boldsymbol{X}}, P_{\boldsymbol{X}})$. Le (S_{X_i}, P_{X_i}) sono dette **distribuzioni marginali**.

Per semplificare la notazione assumeremo che $S_{\boldsymbol{X}} = \mathbb{R}^n$ ponendo $P_{\boldsymbol{X}}(\boldsymbol{x}) = 0$ se $\boldsymbol{x}$ non era originalmente appartenente al codominio di $\boldsymbol{X}$.

LEMMA 15. *Per ogni un vettore aleatorio* $\boldsymbol{X} = (X_1, \ldots, X_n)$ *vale*

$$P_{X_1}(x_1) = \sum_{(x_2, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^{n-1}} P_{\boldsymbol{X}}(x_1, \ldots, x_n).$$

DIMOSTRAZIONE. Per ogni $x_1 \in \mathbb{R}$, gli eventi

$$A_{(x_2, \ldots, x_n)} = \{s \in S : \boldsymbol{x}(s) = (x_1, \ldots, x_n)\} \subseteq S$$

sono disgiunti, per cui

$$\begin{aligned} \sum_{(x_2, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^{n-1}} P_{\boldsymbol{X}}(x_1, \ldots, x_n) &= \sum_{(x_2, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^{n-1}} P(A_{(x_2, \ldots, x_n)}) \\ &= P(\cup_{(x_2, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^{n-1}} A_{(x_2, \ldots, x_n)}) \\ &= P(s : X_1(s) = x_1) = P_{X_1}(x_1) \end{aligned}$$

□

Naturalmente il Lemma precedente si applica ad ogni proiezione o marginale X_i, per cui dalle congiunte si determinano le marginali.

Esercizio 23. *Dimostrare tramite un esempio che l'opposto non è vero e vi sono distribuzioni congiunte diverse che danno luogo alle stesse marginali.*

L'indipendenza delle variabili aleatorie si può esprimere in termini del rapporto tra le distribuzioni congiunta e marginali, nel senso che le componenti di un vettore aleatorio $\boldsymbol{X}= (X_1, \ldots, X_n)$ sono indipendenti se e solo se

$$P_{\boldsymbol{X}}(\boldsymbol{x}) = \prod_{i=1}^{n} P_{X_i}(x_i)$$

per tutti gli $\boldsymbol{x}= (x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n$. Quindi nel caso indipendente le marginali permettono la ricostruzione della distribuzione congiunta.

Se di una o più variabili conosciamo il valore assunto abbiamo delle distribuzioni condizionali.

Definizione 21. *Dato un vettore aleatorio* $\boldsymbol{X}= (X_1, \ldots, X_n)$*, per* $k = 1, \ldots, n$*, se* $(x_1, \ldots, x_k)$ *è tale che* $P(X_1 = x_1, \ldots, X_k = x_k) \neq 0$*, si dice* **distribuzione condizionata o condizionale** *di* $X_{k+1}, \ldots, X_n$ *dato che* $(X_1, \ldots, X_k) = (x_1, \ldots, x_k)$ *lo spazio di probabilità costituito da*

$$\begin{aligned} &S_{X_{k+1},\ldots,X_n|(X_1,\ldots,X_k)=(x_1,\ldots,x_k)} \\ &\quad = \{(x_{k+1}, \ldots, x_n) : (x_1, \ldots, x_k, x_{k+1}, \ldots, x_n) \in S_{\boldsymbol{X}}\} \end{aligned}$$

e

$$\begin{aligned} &P_{X_{k+1},\ldots,X_n|X_1,\ldots,X_k}((x_{k+1}, \ldots, x_n)|(x_1, \ldots, x_k)) \\ &\quad = \frac{P_{\boldsymbol{X}}(\boldsymbol{x})}{P(X_1 = x_1, \ldots, X_k = x_k)} \end{aligned}$$

Naturalmente si può prendere $S_{X_{k+1},\ldots,X_n|(X_1,\ldots,X_k)=(x_1,\ldots,x_k)} = \mathbb{R}^{n-k}$.

Esercizio 24. *Verificare che la coppia definita nella definizione precedente è uno spazio di probabilità .*

Naturalmente la medesima definizione si poteva dare permutando gli indici. Dal teorema delle probabilità totali si vede che

$$\begin{aligned} &P(X_1 = x_1, \ldots, X_n = x_n) \\ &\quad = \sum_{(x_1,\ldots,x_k)\in S_{X_1,dots,X_k}} P_{X_{k+1},\ldots,X_n|X_1,\ldots,X_k}((x_{k+1}, \ldots, x_n)|(x_1, \ldots, x_k)) \\ &\qquad\qquad \cdot P(X_1 = x_1, \ldots, X_k = x_k). \end{aligned}$$

Per $k = 1$ questa osservazione indica come ricostruire la distribuzione congiunta dalla conoscenza delle distribuzioni condizionate e della relativa marginale.

Definizione 22. *Il valore atteso calcolato rispetto alla probabilità condizionale di una variabile aleatoria date le altre si chiama* **valore atteso condizionale** *e si denota*

$$E(X_n|(X_1, \ldots, X_{n-1}) = (x_1, \ldots, x_{n-1}).$$

CAPITOLO 6

PROBABILITÀ NEL CONTINUO

6.1. Variabili aleatorie continue

In molti problemi l'insieme dei valori che possono essere assunti da una variabile aleatoria può avere la cardinalità del continuo. In questo caso la formalizzazione di spazi di probabilità adeguati non è elementare e qui ci limitiamo a trattare un caso particolare in cui l'insieme è $\mathbb{R}$ e la probabilità è determinata da funzioni continue a tratti; questi spazi di probabilità costituiscono la distribuzione di parecchie variabili aleatorie continue che permettono di studiare numerosi problemi. In un certo senso seguiamo la linea storica di studiare prima le variabili aleatorie continue definite dalla loro distribuzione e rimandare la chiarificazione dei fondamenti ad un'analisi successiva.

Sarebbe possibile utilizzare funzioni anche con una infinità numerabile di punti di discontinuità, ma per semplicità consideriamo il caso in cui questi sono al più un numero finito.

Definizione 23. *Uno* **spazio di probabilità sul continuo** *è una coppia* $(\mathbb{R}, f)$ *con* $\mathbb{R}$ *insieme dei numeri reali ed* $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ *una funzione continua tranne al più un numero finito di punti di discontinuità tale che*

(i) $f(x) \geq 0$ *per ogni* $x \in \mathbb{R}$
(ii) $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = 1$

Si noti che l'integrale nella definizione è ben definito, come integrale improprio. Infatti l'integrale esiste in ogni intervallo $[a, b]$ in cui f è continua; inoltre, detto $D(f) = \{x_1, \ldots, x_n\}$, $x_1 < \cdots < x_n$, l'insieme finito dei punti di discontinuità di f e considerate successioni $\bar{x}_j(0) \searrow_j -\infty$, $x_j(i) \nearrow_j x_i$, $\bar{x}_j(i) \searrow_j x_i$ e $x_j(n) \nearrow_j \infty$ esistono gli integrali in $[\bar{x}_j(i), x_j(i+1)]$, $i = 0, \ldots, n-1$. Per definizione di integrale improprio, (ii) dice che il limite seguente esiste, vale quanto indicato:

$$\lim_{j\to\infty} \sum_{i=0}^{n-1} \int_{\bar{x}_j(i)}^{x_j(i+1)} f(x)dx = 1$$

e non dipende dalle successioni scelte. Allo stesso modo sono definiti gli integrali per ogni intervallo $[a, b]$. Conviene in realtà considerare gli intervalli semiaperti della forma $]a, b]$, $a < b$, $a, b \in \overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{-\infty, \infty\}$ perchè si puo' esprimere un ulteriore intervallo come unione di due disgiunti.

Definizione 24. *In uno spazio di probabilità continuo* $(\mathbb{R}, f)$ *si definiscono* **eventi** *le unioni finite di intervallini semiaperti, aperti o chiusi, e si indica con* $\mathcal{C}$ *la famiglia di tali insiemi. Per ogni* $A = \cup_{i=1}^{n}]a_i, b_i]$ *si pone*

$$P_f(A) = \sum_{i=1}^{n} \int_{a_i}^{b_i} f(x)dx.$$

Proposizione 1. *(i) Per ogni* $a \in \mathbb{R}$, $P(\{a\}) = 0$
(ii) $P([a, b]) = P(]a, b[) = P(]a, b])$.

Dimostrazione. (i) si ottiene dalla monotonia della probabilità che implica che per ogni n

$$P(\{a\}) \leq P(]a - 1/n, a]) = 1/n$$

. La parte (ii) si dimostra dalla (i) poiché le differenze tra gli eventi coinvolti sono costituite da uno o due punti al più . □

In accordo con questa Proposizione sarà necessario utilizzare nelle dimostrazioni sui valori della probabilità solo intervallini semiaperti

Si noti che (i) ed (ii) della definizione di spazio di probabilità continuo sono l'analogo di (1) e (2) nella definizione 13. L'additività numerabile invece è qui una conseguenza delle proprietà di additività dell'integrazione rispetto al dominio. Verificheremo per semplicità solo l'additività finita.

Lemma 16. *In uno spazio di probabilità* $(\mathbb{R}, f)$ *se* $A, B \in \mathcal{C}$ *sono tali che* $\cup_{I \in A} I = \cup_{J \in B} J$ *allora* $P_f(A) = P_f(B)$.

Dimostrazione. Si noti che l'intersezione di due intervallini semiaperti non disgiunti è un intervallino semiaperto. Se $A = \{I_1, \ldots, I_n\}$ e $B = \{J_1, \ldots, J_k\}$ allora $\{L_{i,j} = I_i \cap J_j, i = 1, \ldots, n, j = 1, \ldots, k\} \in \mathcal{C}$ e per l'additività dell'integrale rispetto al dominio

$$P_f(A) = \sum_{i=1}^{n} \int_{I_i} f(x)dx = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{k} \int_{L_{i,j}} f(x)dx = \sum_{j=1}^{k} \int_{J_j} f(x)dx = P_f(B)$$

in cui la seconda e la terza uguaglianza dipendono dal fatto che se un intervallo $]a, b]$ è unione finita di intervallini $]a_i, b_i]$ disgiunti allora questi si possono ordinare in modo che $b_i = a_{i+1}$ e

$$\sum_{i=1}^{n} \int_{a_i}^{b_i} f(x)dx = \int_{a}^{b} f(x)dx.$$

□

Uno spazio di probabilità $(\mathbb{R}, f)$ può essere utilizzato per definire la distribuzione di una variabile aleatoria continua.

Definizione 25. *Si dice che una variabile aleatoria continua X ha distribuzione $(\mathbb{R}, f)$ se per ogni $A \in \mathcal{C}$ vale*

$$P(X \in A) = \int_A f(x)dx.$$

In tal caso f è detta la densità di X.

Si noti che l'espressione di sinistra è soltanto formale in quanto non è stato definito lo spazio di probabilità su cui è definito X e su cui agisce P. Diremo anche che $P(X \in [a,b]) = P(X \in]a,b])$.

Esempio 60. *Una variabile aleatoria con densità $f(x) = \mathbb{I}_{[0,1]}$ è detta uniforme in $[0,1]$. In generale, la variabile aleatoria con densità $f(x) = \frac{1}{b-a}\mathbb{I}_{[a,b]}$ è detta* **uniforme** *in $[a,b]$ e si indica $X \sim U([a,b])$.*

Esempio 61. *Una variabile aleatoria con densità $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-x^2/2}$ è detta Gaussiana o* **normale standard**. *In generale, la variabile aleatoria con densità $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{\frac{-(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$ è detta* **gaussiana o normale** *di parametri m e σ^2 (vedremo nel prossimo capitolo il significato) e si usa la notazione $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ (e talvolta $X \sim N(\mu, \sigma)$, quindi bisogna sempre chiarire bene se il secondo termine in parentesi è la varianza o la deviazione standard). Si noti che non esiste una forma elementare per la primitiva della Gaussiana e che solo l'integrale su tutto $\mathbb{R}$ si può calcolare mediante il cambio di variabili in coordinate polari: detto $I = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2/2}dx$ si ha*

$$I^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2/2}dx \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-y^2/2}dx = \int_0^{2\pi}\int_0^{+\infty} re^{-r^2/2}drd\theta = 2\pi.$$

Definiamo ora il valore atteso di una variabile aleatoria continua.

Definizione 26. *Data una variabile aleatoria continua X con densità f si dice* **valore atteso** *di f:*

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} xf(x)dx$$

se esiste

$$E(|X|) = \int_{-\infty}^{\infty} |x|f(x)dx < \infty;$$

per ogni funzione reale di variabile reale g si ha

$$E(g(X)) = \int_{-\infty}^{\infty} g(x)f(x)dx$$

se esiste

$$E(|g(X)|) = \int_{-\infty}^{\infty} |g(x)|f(x)dx < \infty.$$

Con questa definizione valgono tutte le proprietà viste per il valore atteso, la varianza e la deviazione standard di variabili aleatorie.

Esempio 62. *Calcolare valore atteso e SD della distribuzione uniforme su* $[a, b]$.

Esempio 63. *Se* $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ *allora* $E(X) = \mu$ *e* $SD(X) = \sigma$. *Infatti, se* $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ *allora*

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} x e^{-x^2/2} dx = 0$$

essendo la funzione dispari; inoltre integrando per parti questo integrale noto si ha:

$$\begin{aligned} 1 &= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2} dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} ([x e^{-x^2/2}]_{-\infty}^{+\infty} + \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 e^{-x^2/2} dx) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 e^{-x^2/2} dx) \end{aligned}$$

da cui, essendo $E(X) = 0$,

$$Var(X) = E(X^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} x^2 e^{-x^2/2} dx = 1.$$

Per il caso generale basta effettuare il cambio di variabili $z = (x - \mu)/\sigma$.

6.2. Funzione di distribuzione

Una descrizione delle variabili aleatorie che inizia ad unificare il trattamento delle variabili discrete e continue è la funzione cumulativa o funzione di distribuzione.

Definizione 27. *Si dice funzione* **funzione cumulativa** *o* **funzione di distribuzione** F_X *di una variabile aleatoria* X *la funzione* $F_X : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ *tale che*

$$F_X(t) = P(X \leq t).$$

Tale definizione è valida sia per le variabili aleatorie discrete che continue.

Esempio 64. *La funzione di distribuzione di una variabile aleatoria* $Y \sim U(\{1, \ldots, 6\})$ *vale*

$$F_Y(t) = \mathbb{I}_{t \geq 0} \frac{\lfloor t \rfloor \wedge 6}{6}.$$

Esempio 65. *Se* $Z \sim U([a, b])$ *allora*

$$F_Z(t) = \mathbb{I}_{t \geq a} \frac{t \wedge b - a}{b - a}.$$

Esempio 66. *In generale i valori della funzione di distribuzione della normale standard* $\Phi(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{t} e^{-x^2/2} dx$ *non si calcolano attraverso un integrale esplicito e sono approssimati numericamente: si possono trovare in tutti i programmi statistici per computer o tabulati nei testi di probabilità e statistica.*

Descriviamo ora alcune proprietà delle funzioni di distribuzione, una delle quali differenzia le variabili discrete da quelle continue.

TEOREMA 14. *Se X è una variabile aleatoria (discreta o continua) allora*
(1) F_X è non decrescente in t.
(2) $\lim_{t\to-\infty} F_X(t) = 0$
(3) $\lim_{t\to\infty} F_X(t) = 1$
(4) F_X è continua da destra.

Inoltre, se X è una variabile aleatoria discreta allora
(5a) se $(a, b]$ non contiene punti di discontinuità di F_X allora F_X è costante in $(a, b]$.

Se invece X è una variabile aleatoria continua con densità f_X allora
(5b) F_X è continua e $F'_X(t)$ esiste per tutti i punti t tranne al più un numero finito ed è continua.

In tutti i punti t di continuità di f_X vale $F'_X(t) = f_X(t)$

DIMOSTRAZIONE.

(1) Chiaramente $\{s : X(s) \le t\} \subseteq \{s : X(s) \le u\}$ per tutti i $t \le u$ da cui la diseguaglianza sulle probabilità .

(2) Per le variabili discrete

$$\begin{aligned}\lim_{t\to-\infty} F_X(t) &= \lim_{t\to-\infty} P(X \le t)\\ &= \lim_{t\to-\infty} \sum_{x\in S_X : x\le t} P_X(x) = 0\end{aligned}$$

in quanto la sommatoria nell'ultima espressione è il resto di una serie convergente; mentre per le variabili continue

$$\lim_{t\to-\infty} F_X(t) = \lim_{t\to-\infty} \int_{-\infty}^{t} f_X(x)dx = 0$$

per definizione di integrale improprio.

(3) Si ha

$$\lim_{t\to\infty} F_X(t) = 1 - \lim_{t\to-\infty} P(X > t) = 1$$

per gli stessi motivi del punto precedente.

(4) Vale $\lim_{u\searrow t} F_X(u) - F_X(t) = \lim_{u\searrow t} P(t < X \le u) = 0$; per variabili discrete in quanto anche in questo caso, dopo aver riordinato la serie, si tratta del resto di una serie convergente. Per le variabili continue, se f è continua in t allora

$$P(t < X \le u) = \int_t^u f_X(x)dx = \max\{f(x) : x \in [t, u]\}(t - u) \to 0;$$

altrimenti il risultato vale per definizione di integrale improprio in t.

(5) Poiché F_X è non decrescente esiste $\lim_{u\nearrow t} F_X(u) \leq F_X(t)$ e

$$\begin{aligned} F_X(t) - \lim_{u\nearrow t} F_X(u) &= \lim_{u\nearrow t} P(u < X \leq t) \\ &= P(X = t) - \lim_{u\nearrow t} P(u < X < t) = P(X = t) \end{aligned}$$

per gli stessi motivi di (4).

(5a) Quindi se X è discreta F_X è discontinua in t se e solo se $t \in S_X$ e se $(a, b]$ non contiene punti di discontinuità di F_X allora

$$0 = P(X \in (a, b]) = F_X(b) - F_X(a).$$

(5b) Se invece X è continua allora per il teorema fondamentale del calcolo integrale $F_X(t) = \int_{-\infty}^{t} f_X(x)dx$ è derivabile nei punti in cui f_X è continua e vale $F'_X(t) = f_X(t)$. □

Vediamo ora che queste proprietà caratterizzano le funzioni che possono essere funzioni di distribuzione per qualche variabile aleatoria.

Lemma 17. *Se una funzione soddisfa (1)-(4) e (5a) allora è la funzione di distribuzione di una variabile aleatoria discreta; se invece soddisfa (1)-(4) e (5b) è la funzione di distribuzione di una variabile continua.*

Dimostrazione. Da (1) F è non decrescente quindi in ogni punto esiste il limite sinistro $F(t^-)$ e destro $F(t^+)$ e da (2) e (3) è limitata. Per questo l'insieme S dei punti di discontinuità di F è al più numerabile: infatti un punto di discontinuità è caratterizzato dal fatto che $F(t^-) \neq F(t^+)$ e di punti tali che $F(t^+) - F(t^-) \geq 1/n$ ce ne sono al più n; l'unione su n di tali insiemi dà tutti i punti di discontinuità . Inoltre segue da (4) che $F(t) = F(t^+)$.

Se vale (5a) possiamo porre $P(x) = F(t) - F(t^-) > 0$ per ogni $x \in S$. Se indichiamo con $\ldots, x_{-n}, \ldots, x_0, \ldots, x_n, \ldots$ i punti di S ordinati, allora dalla (5a) $F(x_{n-1}) = F(x_{n-1}^+) = F(x_n^-)$ per cui da (2) e (3) segue che:

$$\begin{aligned} \sum_{x\in S} P(x) &= \sum_{N\in\mathbb{Z}} F(x_n) - F(x_n^-) \\ &= \sum_{N\in\mathbb{Z}} F(x_n) - F(x_{n-1}) \\ &= \lim_{n\to\infty} (F(x_n) - F(x_{-n})) = 1. \end{aligned} \tag{6.22}$$

Risulta poi

$$\sum_{x\in S, x\leq t} P(x) = \lim_{n\to\infty} (F(x) - F(x_{-n})) = F(x). \tag{6.23}$$

Se invece vale (5b) si può porre $f(t) = F'(t)$ per tutti i t in cui F è derivabile ed un valore qualunque altrove. Dalla (1) $f \geq 0$ e dalle (2)

e (3)

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(t)dt = \lim_{t\to\infty}(F(t) - F(-t)) = 1.$$

Infine,

$$\int_{-\infty}^{x} f(t)dt = F(x) - \lim_{t\to\infty} -F(-t) = F(x)$$

per cui F è la funzione di distribuzione di una variabile aleatoria di densità f.

□

Definizione 28. *Si dice che due variabili aleatorie continue X ed Y sono uguali in distribuzione, e si indica $X =^d Y$, se $F_X(t) = F_Y(t)$ per ogni t.*

6.3. Variabili esponenziali e Gamma

Oltre alle variabili uniformi e gaussiane, vi sono altre distribuzioni che sono risultate rilevanti in vari contesti applicativi.

Distribuzione esponenziale. Un esempio importante di variabile aleatoria continua ha densità

$$f(t) = \lambda e^{-\lambda t}\mathbb{I}_{t\geq 0}$$

detta **distribuzione esponenziale** $exp(\lambda)$. Si noti che se $X \sim exp(\lambda)$ allora

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} t\lambda e^{-\lambda t}dt = 1/\lambda,$$

$$Var(X) = \int_{-\infty}^{\infty} t^2\lambda e^{-\lambda t}dt - E(X)^2 = 1/(\lambda)^2,$$

e $SD(X) = 1/\lambda$. Inoltre

$$F_X(t) = 1 - e^{-\lambda t}$$

e

$$P(X > t + T|X > t) = e^{-\lambda T}$$

una proprietà che si esprime come perdita di memoria. Per questa caratteristica la distribuzione esponenziale è usata come modello per il tempo di vita di componenti elettronici.

In particolare questo modello potrebbe essere usato per analizzare i tempi di funzionamento dei componenti elettronici di cui all'esempio 2. Per completare l'analisi di questo esempio si devono però considerare le somme di tempi di vita indipendenti, ossia somme di variabili aleatorie continue indipendenti e questo verrà sviluppato nei prossimi capitoli.

Vedremo in seguito che gli intertempi tra arrivi modellizzati da una distribuzione di Poisson sono esponenziali.

Distribuzione Gamma Una variabile aleatoria X con densità

$$f_X(x) = \frac{\lambda(\lambda x)^{k-1}}{\Gamma(k)} e^{-\lambda x}$$

per $x \geq 0$, $\lambda > 0$ e $k \geq 1$, è detta avere distribuzione Gamma e si indica $X \sim \Gamma(k, \lambda)$. Si è preso

$$\Gamma(k) = \int_0^\infty x^{k-1} e^{-x} dx$$

per cui la densità Gamma è ben definita. Si noti che nel caso $k = 1$ si ottiene la distribuzione esponenziale e in generale si vedrà che nel caso k intero ha distribuzione $\Gamma(k, \lambda)$ la somma

$$T_k = X_1 + \ldots X_k$$

di k variabili aleatorie esponenziali indipendenti di parametro λ, mentre $\Gamma(k) = (k-1)!$. Tale somma si può interpretare come il tempo di attesa di k eventi indipendenti in serie.

6.4. Distribuzione congiunta di due variabili aleatorie

Finora abbiamo considerato variabili aleatorie continue isolatamente, ora iniziamo a trattare il caso di due variabili considerate congiuntamente. Il caso di n variabili non conterrà differenze sostanziali tranne la più complessa formalizzazione e la necessità di trattazione algebrica. Per semplicità limiteremo i possibili insiemi di discontinuità nella prossima definizione a rette.

Le variabili aleatorie discrete congiunte sono state già presentate nella sezione su vettori aleatori discreti, ma la presentazione che segue non presupporrà la conoscenza di quanto trattato in quella sezione e presenterà insieme le coppie di variabili discrete e continue.

Definizione 29. *La* **densità congiunta** *di due variabili aleatorie X ed Y discrete su spazi di probabilità S_X ed S_Y è una funzione $p_{X,Y}$ definita su $S_X \times S_Y$ a valori in $\mathbb{R}$ tale che*

(i) $p_{X,Y}(x, y) \in [0, 1]$

e

(ii)$\sum_{S_X \times S_Y} p_{X,Y}(x, y) = 1$

mentre per le variabili continue è una funzione $f_{X,Y} : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, continua tranne al più un insieme costituito da un numero finito di rette, tale che

(i) $f_{X,Y}(x, y) \geq 0$ *per ogni* $(x, y) \in \mathbb{R}^2$

e

(ii) $\int_{\mathbb{R}^2} f_{X,Y}(x, y) dx dy = 1$.

Per $f = f_{X,Y}$ $(\mathbb{R}^2, f)$ è detto spazio di probabilità continua in $\mathbb{R}^2$ e anche **distribuzione congiunta** *di X ed Y;*

per ogni evento A ammissibile si ha

$$P((X,Y) \in A) = \sum_A p_{X,Y}(x,y)$$

per il caso discreto e

$$P((X,Y) \in A) = \int_A f_{X,Y}(x,y)dxdy$$

per il caso continuo. La funzione $F_{X,Y}(x,y) = P(X \leq x, Y \leq y) = P((X,Y) \in (-\infty, x] \times (-\infty, y])$ è detta **funzione di distribuzione congiunta**.

Si noti che gli integrali utilizzati in questa definizione sono integrali di Riemann (eventualmente impropri) in dimensione 2 e sono ben definiti essendo le funzioni coinvolte continue su insiemi normali. Inoltre, nei punti in cui la funzione di distribuzione $F_{X,Y}$ è differenziabile, dal teorema fondamentale del calcolo integrale si ha

$$f_{X,Y}(x,y) = \frac{\partial^2 F_{X,Y}(x,y)}{\partial x \partial y}.$$

Definizione 30. *Data la distribuzione congiunta di due variabili aleatorie X ed Y, la distribuzione di X si ottiene considerando la* **distribuzione marginale** *la cui densità f_X soddisfa*

$$p_X(x) = P(X = x) = \sum_{S_Y} p_{X,Y}(x,y),$$

infatti essendo gli eventi $\{Y = y\}$ al variare di $Y \in S_Y$ una partizione si ha

$$P(X = x) = P((X = x) \cap \cup_{y \in S_Y}(Y = y)) = \sum_{y \in Y} P((X = x) \cap (Y = y).$$

Per il caso continuo si pone quindi:

$$f_X(x) = \int_{\mathbb{R}} f(X,Y)dy.$$

Da questo punto di vista $p_X = P_X$, f_X e le analoghe $p_Y = P_Y$ ed f_Y sono dette **densità marginali***di X ed Y rispettivamente.*

Per cui dalle congiunte si determinano le distribuzioni marginali.

Esempio 67. *Sia $f = c \cdot \mathbb{I}_T$ in cui T è il triangolo*

$$\{\boldsymbol{x} = (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq x_1 \leq 1, 0 \leq x_2 \leq 1 - x_1\}.$$

Dalla (ii) della definizione di spazio continuo si ha

$$\begin{aligned} 1 &= \int_{\mathbb{R}^2} f(x,y)dxdy \\ &= c\int_{\mathbb{R}}(\int_{\mathbb{R}} \mathbb{I}_T(x,y)dy)dx \\ &= c\int_0^1(\int_0^{1-x} dy)dx \\ &= c\int_0^1 (1-x)dx = c/2 \end{aligned} \tag{6.24}$$

da cui $c = 2$, poichè essendo i domini di integrazione normali e l'integranda continua l'integrale si può calcolare tramite integrali ripetuti. La marginale di X si ottiene da

$$f_X(x) = \int_{\mathbb{R}} f(x,y)dy = 2(1-x_1).$$

Data una funzione $\Phi : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ ed una coppia di variabili aleatorie X ed Y di cui sia nota la densità congiunta, la composizione $\Phi(X,Y)$ è una variabile aleatoria. Si vede, per il caso continuo dalle formule del cambiamento di variabili, che vale la seguente naturale espressione per il valore atteso:

$$E(\Phi(X,Y)) = \sum_{S_X \times S_Y} \Phi(x,y)p_{X,Y}(x,y) \tag{6.25}$$

e

$$E(\Phi(X,Y)) = \int_{\mathbb{R}^2} \Phi(x,y)f_{X,Y}(x,y)dxdy. \tag{6.26}$$

Anche qui vale l'additività del valore atteso

Lemma 18. *Data una coppia di variabili aleatorie X ed Y si ha*

$$E(X+Y) = E(X) + E(Y).$$

Dimostrazione.

$$\begin{aligned} E(X+Y) &= \int_{\mathbb{R}^2} (x+y)f_{X,Y}(x,y)dxdy \\ &= \int_{\mathbb{R}}(\int_{\mathbb{R}} xf_{X,Y}(x,y)dy)dx + \int_{\mathbb{R}}(\int_{\mathbb{R}} yf_{X,Y}(x,y)dx)dy \\ &= \int_{\mathbb{R}} xf_X(x)dx + \int_{\mathbb{R}} xf_Y(y)dy = E(X) + E(Y) \end{aligned}$$

□

L'indipendenza delle variabili aleatorie continue si può esprimere in termini del rapporto tra densità congiunta e marginali, nel senso che due variabili aleatorie X ed Y sono **indipendenti** se e solo se

$$p_{X,Y}(x,y) = P(X=x, Y=y) = P(X=x)P(Y=y) = p_X(x)p_Y(x)$$

per il caso discreto e

$$f_{X,Y}(x,y) = f_X(x)f_Y(y)$$

per tutti $(x,y) \in \mathbb{R}^2$, per il caso continuo. Quindi le marginali permettono la ricostruzione della distribuzione congiunta quando le variabili siano indipendenti.

LEMMA 19. *Se X ed Y sono variabili aleatorie indipendenti allora*

$$E(XY) = E(X)E(Y).$$

DIMOSTRAZIONE.

$$\begin{aligned} E(XY) &= \int_{\mathbb{R}^2} xy f_{X,Y}(x,y)dxdy \\ &= \int_{\mathbb{R}^2} x f_X(x) y f_Y(y)dxdy \\ &= \int_{\mathbb{R}} x f_X(x)dx \int_{\mathbb{R}} y f_Y(y)dy = E(X)E(Y) \end{aligned}$$

□

Si possono poi definire le distribuzioni condizionali.

DEFINIZIONE 31. *Date variabili aleatorie X ed Y con densità congiunta si definisce* **densità condizionata** *o condizionale di X dato Y la funzione*

$$p_{X|Y}(x|y) = \frac{p_{X,Y}(x,y)}{p_Y(y)}$$

nel caso discreto e

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f_{X,Y}(x,y)}{f_Y(y)}$$

nel caso continuo per tutti i valori $x \in \mathbb{R}$ e $y \in \mathbb{R}$ tali che $p_Y(y) \neq 0$ o$f_Y(y) \neq 0$.

Per un generico evento ammissibile A

$$P(X \in A|Y = y) = \sum_{\mathbb{A}} p_{X|Y}(x|y)$$

o

$$P(X \in A|Y = y) = \int_{\mathbb{A}} f_{X|Y}(x|y)dx.$$

DEFINIZIONE 32. *Il valore atteso calcolato rispetto alla probabilità condizionale di una variabile aleatoria date le altre si chiama* **valore atteso condizionale** *o condizionato e si denota*

$$E(X|Y = y) = \sum_{S_Y} x p_{X|Y}(x|y).$$

o

$$E(X|Y = y) = \int_{\mathbb{R}} x f_{X|Y}(x|y)dy.$$

Vale poi la seguente versione del teorema delle probabilità totali:

$$p_X(x) = \sum_{S_Y} p_{X|Y}(x|y)p_Y(y)$$

e

$$f_X(x) = \int_{\mathbb{R}} f_{X|Y}(x|y)f_Y(y)dy$$

e quindi

$$P(X \in A) = \int_{\mathbb{R}}\int_A f_{X|Y}(x|y)f_Y(y)dydx = \int_{\mathbb{R}} P(X \in A|Y = y)f_Y(y)dy.$$

Esempio 68. *Verifichiamo che se X ed Y sono $Exp(\lambda)$ e indipendenti allora $X + Y \sim \Gamma(2, \lambda)$. Infatti,*

$$\begin{aligned} f_{X+Y}(t) &= \int_{-\infty}^{+\infty} \lambda e^{-\lambda x}\mathbb{I}_{x>0}\lambda e^{-\lambda(t-x)}\mathbb{I}_{t-x>0}dx \\ &= \lambda^2 e^{-\lambda t}\int_0^t dx = t\lambda^2 e^{-\lambda t}. \end{aligned}$$

In generale, se $X \sim \Gamma(k, \lambda)$ ed $Y \sim \Gamma(h, \lambda)$ sono indipendenti allora $X + Y \sim \Gamma(k + h, \lambda)$, integrando per parti si ha

$$\begin{aligned} f_{X+Y}(t) &= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\lambda^k x^{k-1}}{(k-1)!}e^{-\lambda x}\mathbb{I}_{x>0}\frac{\lambda^h (t-x)^{h-1}}{(h-1)!}e^{-\lambda(t-x)}\mathbb{I}_{t-x>0}dx \\ &= \lambda^{k+h}e^{-\lambda t}\int_0^t \frac{x^{k-1}(t-x)^{h-1}}{(k-1)!(h-1)!}dx \\ &= \lambda^{k+h}e^{-\lambda t}([\frac{x^k(t-x)^{h-1}}{k!(h-1)!}]_0^t + \int_0^t \frac{x^k(t-x)^{h-2}}{(k)!(h-2)!}dx) \\ &= \lambda^{k+h}e^{-\lambda t}\int_0^t \frac{x^{k-1+h-1}}{(k-1+h-1)!}dx \\ &= \frac{t^{k+h-1}\lambda^{k+h}}{(k+h-1)!}e^{-\lambda t}. \end{aligned}$$

Esempio 69. *Verifichiamo che se $X, Y \sim N(0, 1)$ indipendenti allora $X + Y \sim N(0, 2)$, indicando le varianze (oppure $X + Y \sim N(0, \sqrt{2})$ indicando le deviazioni standard). Infatti, separando l'esponente in un quadrato con resto e cambiando poi la variabile d'integrazione in $\sqrt{2}x - t/\sqrt{2}$, si ha:*

$$\begin{aligned} f_{X+Y}(t) &= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{2\pi}e^{-x^2/2}e^{-(t-x)^2/2}dx \\ &= \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(\sqrt{2}x-t/\sqrt{2})^2/2-t^2/4}dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-t^2/2}. \end{aligned}$$

In generale, se $X \sim N(\mu_X, \sigma_X^2)$ e $Y \sim N(\mu_Y, \sigma_Y^2)$ indipendenti, allora $X + Y \sim N(\mu_X + \mu_Y, \sigma_Y + \sigma_Y^2)$ come si vede ora. Nel prossimo

calcolo completeremo il quadrato all'esponente ottenendo delle costanti (ossia funzioni di σ_X ecc. ma non della variabile di integrazione x e della variabile della funzione t), ma il loro valore sarà irrilevante, quindi non lo calcoliamo. Potremo calcolare quanto sarà il valore di tali costanti direttamente nell'ultima formula in quanto sappiamo che $\int_{-\infty}^{+\infty} f_{X+Y}(t)dt = 1$. Per calcolare l'integrale nella terza riga si effettua il cambiamento di variabili $z = ax + bt$ ed il risultante integrale si calcola essendo l'integranda una gaussiana.

$$\begin{aligned} f_{X+Y}(t) &= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_X} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_Y} e^{-(x-\mu_X)^2/(2\sigma_X)} e^{-(t-x-\mu_Y)^2/(2\sigma_Y)} dx \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(\alpha x^2+\beta xt+\gamma t^2)/2-\gamma' t^2} dx \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(ax+bt)^2/2-\gamma' t^2} dx \\ &= e^{-\gamma' t^2} \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} c e^{-z^2/2} dz = d e^{-\gamma' t^2}. \end{aligned}$$

Abbiamo quindi concluso che la densità di $X + Y$ è gaussiana. Ora, poiché sappiamo che $E(X+Y) = E(X)+E(Y) = \mu_X+\mu_Y$ e $Var(X+Y) = Var(X) + Var(Y) = \sigma_X^2 + \sigma_Y^2$, quest'ultima uguaglianza discendendo dall'indipendenza, necessariamente $X+Y \sim N(\mu_X+\mu_Y, \sigma_Y+\sigma_Y^2)$ e la forma delle costanti d e γ' è determinata.

Relazioni con la distribuzione di Poisson. Date variabili aleatorie i.i.d. $X_i \sim Exp(\lambda)$ ed un valore $T > 0$ consideriamo la probabilità che

$$\{N_T = k\} = \{\sum_{i=1}^{k} X_i < T < \sum_{i=1}^{k+1} X_i\}$$

che si può interpretare dicendo che il $k+1$-simo tempo di vita è quello che permette al totale di superare T, ossia che il numero N_T di interruzioni prima di T è esattamente k. Dalla formula delle probabilità totali per le densità condizionate continue si ha

$$P(N_T = k) = \int_0^T \frac{\lambda(\lambda x)^{k-1}}{\Gamma(k)} e^{-\lambda x} e^{-\lambda(T-x)} dx = \frac{(\lambda T)^k}{k!} e^{-\lambda(T)}$$

ossia N_T ha distribuzione di Poisson(λT).

Vogliamo introdurre ora una misura della dipendenza di variabili aleatorie che vale sia per le variabili discrete che per quelle continue, limitandoci al caso appena trattato di due variabili. Abbiamo visto che nel caso di variabili aleatorie indipendenti il valore atteso del prodotto si fattorizza, per cui viene naturale di studiare la quantità seguente:

Definizione 33. *Dato un vettore aleatorio (X, Y), ossia due variabili aleatorie e la loro distribuzione congiunta, tali che $E(X^2), E(Y^2) <$*

∞, *si dice* **covarianza** *di* X *ed* Y *il valore*

$$Cov(X,Y) = E(XY) - E(X)E(Y).$$

Si noti che per il Lemma 14 la definizione è ben posta e che vale $Cov(X,X) = Var(X)$.

LEMMA 20.

$$Cov(X,Y) = E((X - E(X)(Y - E(Y)).$$

DIMOSTRAZIONE. Se $Cov(X,Y)$ esiste allora $E(X^2), E(Y^2) < \infty$ ed anche $E(|XY|), E(|X|), E(|Y|) < \infty$, il che implica che

$$\begin{aligned} E(|X - E(X)||Y - E(Y)|) &\leq E(|XY| + |X||E(Y)| + |Y||E(X)| \\ &\quad +|E(X)||E(Y)|) \\ &\leq E(|XY|) + 3E(|X|)E(|Y|) < \infty \end{aligned}$$

per cui $E((X - E(X))(Y - E(Y))$ esiste. Ora

$$\begin{aligned} E((X - E(X))(Y - E(Y)) &\leq E(XY) - XE(Y) - YE(X) \\ &\quad +E(X)E(Y) \\ &\leq E(XY) + E(X)E(Y) < \infty \end{aligned}$$

□

Dimensionalmente $Cov(X,Y)$ è il prodotto delle dimensioni di X ed Y. Per ottenere un numero puro dividiamo per il prodotto delle deviazioni standard, o equivalentemente, consideriamo la correlazione tra le variabili standardizzate.

DEFINIZIONE 34. *Date variabili aleatorie* X *ed* Y *con distribuzione congiunta tali che* $E(X^2), E(Y^2) < \infty$, *si dice* **correlazione** *di* X *ed* Y *il valore*

$$r = r(X,Y) = \frac{Cov(X,Y)}{SD(X)SD(Y)}.$$

Data una variabile aleatoria X con secondo momento finito, la **variabile standardizzata** è definita da $\bar{X} = \frac{X - E(X)}{SD(X)}$ e valgono $E(\bar{X}) = 0$ e $Var(\bar{X}) = E(\bar{X}) = 1 = SD(\bar{X})$

LEMMA 21. $r = E(\bar{X}\bar{Y}) = Cov(\bar{X}\bar{Y})$

DIMOSTRAZIONE. Dalle proprietà di $\bar{X}$ e $\bar{Y}$ si ha

$$\begin{aligned} Cov(\bar{X}\bar{Y}) &= E(\bar{X}\bar{Y}) \\ &= E((\frac{X - E(X)}{SD(X)})(\frac{Y - E(Y)}{SD(Y)})) \\ &= \frac{Cov(X,Y)}{SD(X)SD(Y)} \end{aligned}$$

□

Oltre ad essere un numero puro la correlazione è limitata:

Teorema 15. *Per ogni coppia di variabili aleatorie X ed Y con secondo momento finito si ha*

$$-1 \leq r(X,Y) \leq 1;$$

inoltre $r = 1$ se e solo se $Y = cX + d$ con $c > 0$ ed $r = -1$ se e solo se $Y = -cX + d$ con $c > 0$.

Dimostrazione. La dimostrazione che segue può essere letta in due modi, prima considerando solo i simboli in alto poi quelli in basso nelle coppie $\pm$ e $\mp$. Si ha che

$$\begin{aligned} 0 \leq E(\bar{X} \pm \bar{Y})^2 &= E(\bar{X}^2) + E(\bar{Y}^2) \pm 2E(\bar{X}\bar{Y}) \\ &= 2 \pm 2r(X,Y). \end{aligned} \tag{6.27}$$

Questo implica che

$$-1 \leq r(X,Y) \leq 1;$$

inoltre, se $r(X,Y) = \mp 1$ vale il segno di uguaglianza in (6.27) per cui $E(\bar{X} \pm \bar{Y})^2 = 0$. Poiché $(\bar{X} \pm \bar{Y})^2 \geq 0$ ne discende che $\bar{X} = \mp\bar{Y}$ e di conseguenza

$$Y = \mp\frac{SD(Y)}{SD(X)}X - \frac{SD(Y)}{SD(X)}E(X) + E(Y) = \mp cX + d$$

con $c = \frac{SD(Y)}{SD(X)} \geq 0$. □

6.5. Vettori aleatori continui

Anche per il caso continuo introduciamo i vettori aleatori, naturalmente attraverso le loro densità congiunta. Per semplicità ammettiamo insiemi di possibili discontinuità lineari.

Definizione 35. *Uno spazio di probabilità continua in $\mathbb{R}^n$ è una coppia $(\mathbb{R}^n, f)$ in cui $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ è una funzione continua tranne al più un insieme costituito da un numero finito di iperpiani tale che*

(i) $f(\boldsymbol{x}) \geq 0$ per ogni $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n$.

(ii) $\int_{\mathbb{R}^n} f(\boldsymbol{x})d\boldsymbol{x} = 1$

Si dice che un vettore aleatorio continuo $\boldsymbol{X} = (X_1, \ldots, X_n)$ n-dimensionale ha distribuzione $(\mathbb{R}^n, f_{\boldsymbol{X}})$ se per ogni plurirettangolo $A = \prod_{i=1}^n (a_i, b_i]$ si ha

$$P(\boldsymbol{X} \in A) = \int_A f_{\boldsymbol{X}}(\boldsymbol{x})d\boldsymbol{x}.$$

La distribuzione di un vettore aleatorio $\boldsymbol{X} = (X_1, \ldots, X_n)$ è detta anche **distribuzione congiunta** *delle X_i e la funzione $f_{\boldsymbol{X}}(\boldsymbol{x})$ è detta* **densità congiunta**.

Si noti che gli integrali utilizzati in questa definizione sono integrali di Riemann (eventualmente impropri) in dimensione n e sono ben definiti essendo le funzioni coinvolte continue su insiemi normali. Si possono ripetere ora molte definizioni e proprietà dei vettori aleatori discreti.

DEFINIZIONE 36. *In un vettore aleatorio continuo* $\boldsymbol{X} = (X_1, \ldots, X_n)$, *ciascuna delle sue componenti* X_i *è una variabile aleatoria continua, con una sua distribuzione* $(\mathbb{R}, f_{X_i})$ *ottenuta come* **distribuzione marginale** *da*

$$f_{X_1}(x_1) = \int_{\mathbb{R}^{n-1}} f(\boldsymbol{x}) dx_2 \cdot \ldots \cdot dx_{n-1}.$$

Naturalmente la definizione precedente si applica ad ogni proiezione o marginale X_i, per cui anche nel caso continuo dalle congiunte si determinano le distribuzioni marginali.

ESEMPIO 70. *Sia* $f = c \cdot \mathbb{I}_T$ *in cui* T *è il triangolo*

$$\{\boldsymbol{x} = (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq x_1 \leq 1, 0 \leq x_2 \leq 1 - x_1\}.$$

Dalla (ii) della definizione di spazio continuo si ha

$$\begin{aligned} 1 &= \int_{\mathbb{R}^2} f(\boldsymbol{x}) d\boldsymbol{x} \\ &= c \int_{\mathbb{R}} (\int_{\mathbb{R}} \mathbb{I}_T(\boldsymbol{x}) dx_2) dx_1 \\ &= c \int_0^1 (\int_0^{1-x_1} dx_2) dx_1 \\ &= c \int_0^1 (1 - x_1) dx_1 = c/2 \end{aligned} \tag{6.28}$$

da cui $c = 2$, *poichè essendo i domini di integrazione normali e l'integranda continua l'integrale si può calcolare tramite integrali ripetuti. La marginale di* X_1 *si ottiene da*

$$f_{X_i}(x_1) = \int_{\mathbb{R}^{n-1}} f(\boldsymbol{x}) dx_2 = 2(1 - x_1).$$

Data una funzione $\Phi : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ ed un vettore aleatorio $\boldsymbol{X}$, la composizione $\Phi(\boldsymbol{X})$ è una variabile aleatoria. Senza determinarne la densità possiamo fin da ora calcolarne il valore atteso rispetto alla distribuzione di $\boldsymbol{X}$ come

$$E(\Phi(\boldsymbol{X})) = \int_{\mathbb{R}^n} \Phi(\boldsymbol{x}) f(\boldsymbol{x}) d\boldsymbol{x}.$$

LEMMA 22. *Dato il vettore aleatorio* $\boldsymbol{X} = (X_1, \ldots, X_n)$ *si ha*

$$E(\sum_{i=1}^n X_i) = \sum_{i=1}^n E(X_i).$$

Dimostrazione. Utilizzando l'induzione su n, è sufficiente dimostrare l'asserzione per $n = 2$:

$$\begin{aligned} E(X_1 + X_2) &= \int_{\mathbb{R}^2} (x_1 + x_2) f(\boldsymbol{x}) d\boldsymbol{x} \\ &= \int_{\mathbb{R}} (\int_{\mathbb{R}} x_1 f(\boldsymbol{x}) dx_2) dx_1 + \int_{\mathbb{R}} (\int_{\mathbb{R}} x_2 f(\boldsymbol{x}) dx_1) dx_2 \\ &= \int_{\mathbb{R}} x_1 f_{X_1}(x_1) dx_1 + \int_{\mathbb{R}} x_2 f_{X_2}(x_2) dx_2 = E(X_1) + E(X_2) \end{aligned}$$

□

L'indipendenza delle variabili aleatorie continue si può esprimere in termini del rapporto tra densità congiunta e marginali, nel senso che le componenti di un vettore aleatorio $\boldsymbol{X} = (X_1, \ldots, X_n)$ sono indipendenti se e solo se

$$f_{\boldsymbol{X}}(\boldsymbol{x}) = \prod_{i=1}^{n} f_{X_i}(x_i)$$

per tutti $\boldsymbol{x} = (x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n$. Anche per le variabili continue le marginali permettono la ricostruzione della distribuzione congiunta quando le variabili siano indipendenti.

Lemma 23. *Se le variabili aleatorie continue X_i, $i = 1, \ldots, n$ sono indipendenti allora*

$$E(\prod_{i=1}^{n} X_i) = \prod_{i=1}^{n} E(X_i).$$

Dimostrazione.

$$\begin{aligned} E(\prod_{i=1}^{n} X_i) &= \int_{\mathbb{R}^n} \prod_{i=1}^{n} x_i f(\boldsymbol{x}) d\boldsymbol{x} \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} \prod_{i=1}^{n} (x_i f_{X_i}(x_i)) d\boldsymbol{x} \\ &= \prod_{i=1}^{n} \int_{\mathbb{R}^n} x_i f_{X_i}(x_i) dx_i = \prod_{i=1}^{n} E(X_i) \end{aligned}$$

□

Anche per le variabili continue è possibile definire le distribuzioni condizionali.

Definizione 37. *Dato un vettore aleatorio $\boldsymbol{X} = (X_1, \ldots, X_n)$, per $k = 1, \ldots, n$, se $(x_1, \ldots, x_k)$ è tale che la densità marginale soddisfa $f_{(X_1,\ldots,X_k)}(x_1, \ldots .x_k) \neq 0$, si dice* **distribuzione condizionata** *di $X_{k+1}, \ldots, X_n$ dato che $(X_1, \ldots, X_k) = (x_1, \ldots, x_k)$ lo spazio di*

probabilità costituito da $\mathbb{R}^{n-k}$ *con densità*

$$f_{(X_{k+1},\ldots,X_n)|(X_1,\ldots,X_k)}((x_{k+1},\ldots,x_n)|(x_1,\ldots,x_k)) = \frac{f_{\boldsymbol{X}}(\boldsymbol{x})}{f_{(X_1,\ldots,X_k)}(x_1,\ldots.x_k)}$$

Definizione 38. *Il valore atteso calcolato rispetto alla probabilità condizionale di una variabile aleatoria date le altre si chiama* **valore atteso condizionale** *e si denota*

$$E(X_n|(X_1,\ldots,X_{n-1}) = (x_1,\ldots,x_{n-1})).$$

Le definizioni di $Cov(X,Y)$ e $r(X,Y)$ sono le stesse del caso discreto.

Consideriamo ora variabili i.i.d. tali che esistono valore atteso e varianza: vale il seguente risultato.

Teorema 16 (Teorema Centrale del Limite). *Per variabili aleatorie i.i.d.* $X_1,\ldots,X_n$ *tali che* $E(X_i^2) < \infty$ *vale per ogni* $a \in \mathbb{R}$

$$\lim_{n\to\infty} P\left(\frac{\sum_{i=1}^n X_i - nE(X_1)}{\sqrt{nVar(X_1)}} \leq a\right) = \int_{-\infty}^a \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2} dx$$